



母雞不能站立

可能雞蟲太多

問：我有一隻母雞，自從孵出幼雛以後，兩腳不能直立，彎曲而行。日子長了，這母雞就完全走不動了，只能靠兩翅撲撲跳跳，約有一個月之久而死掉了。請問這是什麼病，怎樣治療？（雲林縣北港鎮趙武三）

答：你的母雞孵出雛雞後，兩腳不能直立，這很可能是母雞在孵蛋時，兩腳無力。飼養上應餵牠混合飼料（參照本年五卷十一期「家禽的飼料配合」）。管理上要經常檢查雞身上有無雞蟲發生，去除雞蟲可用DDT粉（10%）撒佈雞體，用手摸擦使與皮膚接觸，十日後再施行第二次。（省農業試驗所李登元）

雞場消毒用石灰

最是經濟又便利

問：①預防雞病，在雞舍內和運動場撒佈石灰是否有效？（彰化縣永靖鄉劉興權）

②雞的運動場消毒，在臺灣用什麼藥品最為經濟而有效？場地裡的蛔蟲卵，要用什麼藥品來撲滅？（高雄市長營陳甲庚）

答：①②雞運動場的消毒，應用石灰是最經濟又便利。消毒方法，可

讀者服務

△出讓優良葡萄苗：紫色最新種トランブアン及黃色大果種チャビオン。宜蘭市東林里十四鄰十七號宜成農場李炳炎。

△徵求優良種乳羊數頭。臺北縣新店鎮大坪林實斗厝路三十二號之三劉伯平。

先把表土取去約一寸，撒佈石灰，然後再舖粗砂。（李登元）

雞舍的出入口應經常備置石灰，以便出入人等鞋履的消毒，這樣可防止病菌的帶入。

運動場每隔四、五個月，應撒佈石灰，經數天以後，加以耕鋤，然後再撒佈石灰，如此可使某種病原菌和寄生蟲卵死滅。運動場撒佈石灰，也能使糞等有機物質分解淨化，以免蒼蠅群集，成為疾病的媒介。

砂浴場中如混入石灰，可便於寄生蟲的驅除。總之，撒佈石灰有益無害。（省農業試驗所鄭謀平）

家禽注射預防疫苗的要點

問：①小雞在多大時可以注射雞霍亂疫苗和新城雞瘟疫苗？是否兩者可以同時注射？

②注射過疫苗的雞，經過多久才開始有免疫力？有效期有多久？

③公雞與母雞注射量是否相同？

④已患病的雞是否可以注射疫苗來治療？（嘉義縣溪口鄉陳源祥）

桃園縣龍潭鄉陳乃康（臺中縣東勢鎮倪福來）（桃園縣新屋鄉朱德馨）

答：①小雞一個月後可以進行雞霍亂或新城病疫苗的預防注射。新城雞瘟與雞霍亂兩種預防注射，要相隔一個月實施。總之注射預防疫苗，是要看某地時常流行的那一種傳染性疾病，就作那一種的預防。這地方假如沒有發生傳染病，要注射許多種的疫苗，那就增加飼養管理的費用了。

②注射過新城病等疫苗的雞，通常一、二星期後就發生免疫力。凡經注射的雞隻，初期抗病力反而較弱。

一次預防注射的有效期是三個月到半年；二次預防注射，即四星期注射一次，以後到十六星期再注射第二次，其效期可在一年以上。

③公雞與母雞的預防注射量大致相同。如果公雞與母雞的體重相差很多的話，當然用量也有差異。所以注射的劑量應參照預防液產品的說明書辦理。

④已患傳染病的雞隻只可以注射血清治療，千萬不能用預防疫苗注射，否則會加速死亡。（李登元）



母豬乳頭以五六對最好

問：我看養豬便覽上說，關於選擇母豬，牠的乳頭數要有五至六對為佳，但做地農民說乳頭數以四對為最佳，四對的是一八對乳，可以餵養十六頭仔豬，五至六對還抵不上四對的好，這種說法是否確切？（雲林縣口湖鄉吳國忠）

答：母豬乳頭數，以有五至六對最好，這是根據科學實驗出來的。所說四對（八對乳）最好，這是迷信的傳說，並不可靠。至於說八對乳頭，可以哺十六隻仔豬，更是不可能的事情。（鄭謀平）

水牛跛行可能有異物入蹄

問：水牛的前右腳不能走路，走時慢慢倒下，身體向右邊傾斜，不走時看不出有什麼病狀。食量照常。那隻腳不肯讓人動牠。請問是否右前腳有病，要怎樣治療？（苗栗縣後龍鎮葉新財）

答：據你所說的推測，這隻水牛的前右腳，必定在蹄底有異物如破片、鐵釘、尖石、木棒等的刺入或傷害，所以須把這隻受傷的腳設法提起，用清水洗淨，再仔細的檢查，如發現有異物，就必須拿掉，如有破傷就要消毒（可用三%硼酸水），然後塗上碘酒，休息幾天就會好。（省農業試驗所黃立群）

如蒙賜顧極表深深謝忱
種子足農家的生產根源
採辦種子必須鄭重選擇
零售批發確保信用卓著
光顧農友決不勞資兼損
保證豐收快樂增產報國
敬請諸位先生倍予賜顧

美國洋效罐裝鳳梨型

美國結頭菜罐裝
美國胡蘿蔔（人參）罐裝
北平結頭菜
南畔州早茶頭
長岡交配一號甘藍
三池中生甘藍
金澤粗蘭結頭菜
肉甲包心芥菜
獻上早中晚生花椰菜
各種日製噴霧器 各種農藥殺蟲劑
其他各種種子，如蒙光顧，無任感謝。不論多寡，悉聽尊便。

合成種子行

臺北市迪化街一段三五號

電話 四三三三號

南部分銷處：四海種子行

嘉義市民族路壹號