

（圖三）糊仔甘藍套種水稻殘株的距行株距如圖，小三角形，應隨時補植好。菜苗在糊仔間（即水稻被覆期間），如發生夜盜蟲等害蟲，可用砒酸鉛粉劑，撒佈防治。培土整畦後，注意田間的水分。旱時應酌予灌溉，雨天時應注意排水。中耕儘量於菜苗幼小時舉行，株形增大後不宜中耕，又在葉球結球期尤其是收穫期，往往因水分過多，引起葉球破裂，所以要設法保持適量水分，使甘藍葉球正常發育。

糊仔栽植後，如發現有缺株，應隨時補植，儘量於一星期內補植好。菜苗在糊仔間（即水稻被覆期間），如發生夜盜蟲等害蟲，可用砒酸鉛粉劑，撒佈防治。培土整畦後，注意田間的水分，旱時應酌予灌溉，雨天時應注意排水。中耕儘量於菜苗幼小時舉行，株形增大後不宜中耕，又在葉球結球期尤其是收穫期，往往因水分過多，引起葉球破裂，所以要設法保持適量水分，使甘藍葉球正常發育。

（七）適期的收穫

甘藍的成熟期，依品種略有不同，如成功甘藍，從糊仔栽植後約八十五四左右，可能成熟。收穫不宜過早或過晚，要看葉球成熟情形而定。葉球完全結球而嫩白時，為收穫適期。收穫的葉球，整形後出售。如市價低落，可以連外葉切取，堆積於陰涼室內貯藏，待市價較有利時再出售。收穫應分期節制數量，可以調節市場價格。

（八）害蟲的防治

為害糊仔甘藍的主要害蟲，有斜紋夜盜蛾蟲，蚜蟲，和菜心螟最為厲害。防治這類害蟲，要從育苗時期開始。防治菜心螟可以用DDT二五%乳劑，五〇〇—六〇〇倍液；或用BHC六·五%可濕性粉劑，五〇〇倍液；噴射於甘藍葉面。蚜蟲類可用魚藤精乳劑五〇〇倍液劑防治。育苗期間須注意害蟲發生情形，按害蟲種類用DDT或魚藤精等，每隔一星期噴射一次。甘藍定植的前一天，一定要詳細觀察害蟲發生情形，再噴射一次，以免菜心螟或蚜蟲等害蟲帶入本圃中。定植後仍須要每隔十日左右，噴射藥液一次。



（圖四）各次追肥的位置

種植綠肥經驗談

新竹縣湖口鄉農友　余業璇

我在前年第二期作收穫後的冬季休閒期間，種植約五分地的綠肥，其中三分地是大菜花，二分地是蚕豆。所收穫得到的生菜葉，大菜花約七千斤，蚕豆約五千斤。我把這些生菜葉，平均撒佈在一甲地的田面上。結果去年第一期作，比往年增收約一千臺斤（一甲地收量七千四百臺斤），穀粒飽滿，同時土壤也比較往年鬆而軟。我希望各位農友兄弟，在本年第二期作水稻收穫以後，多多種植綠肥，以提高產量，改良土壤。我的栽培方法，簡單的列舉於下：①大菜花栽培法：在第二期作水稻收穫後，作寬約三公分的畦，大菜種子摻和細堆肥，每隔五十公分左右點播。要注意排水，播種後二十五天左右，施用一次的人糞尿。等到次年二三月花盛開，下部的角果稍充實時，刈割犁入土中，作為肥料。②蚕豆：第二期作水稻收穫後，作寬約二公尺的畦，行距六十五公分，株距三十五公分。每穴點播三粒種子，上面覆以四公分的堆肥。蚕豆不須多施肥料，只在生長初期施一次少量的人糞尿，並中耕除草一次即可。次年第一期作插秧前十天，即可刈割平均撒佈於田上，犁起作為肥料。

（六）栽植後的管理

如成功甘藍，從糊仔栽植後約八十五時，同時除草培土，可以節省勞力。又加用人糞尿做追肥，可以提高甘藍的產量和品質。

農村福音

經濟部中央標準局臺專字第200號特准專利十五年的最理想「粟穀碾白機」現已出品了



特點

節省勞費　在家碾米
不經脫殼　直接碾白
所得糠末　足抵機耗
堅固輕便　經濟實惠

使用方法：

脚踏型，往次用谷十—十五臺斤，僅碾二十分鐘，即可變成白米，若要脚踏更輕，則一次投入谷十臺斤，脚踏十分鐘後，同樣亦踏十分鐘，全部取出，次再投入谷十臺斤，再踏十分鐘後，即將第一次碾谷加入三—五臺斤，再踏十分鐘後，即成白米。且可兼裝置製籾機兩用。

又動力用，每次投入谷十正臺斤或二十五臺斤，或五十臺斤計三種，馬達用半馬以上即可。

如蒙賜顧　無任歡迎

農具製造批發零售

重茂行

臺中市中區民權路四六號

電話：一九一八號（轉）