

時，同時除草培土，可以節省勞力。又加用人糞尿做追肥，可以提高甘藍的產量和品質。

種植綠肥經驗談

新竹縣湖口鄉農友 余業璇

(六) 栽植後的管理

我在前年第二期作收穫後的冬季休閒期間，種植約五分地的綠肥，其中三分地是大菜花，二分地是蚕豆。所收穫得到的生莖葉，大菜花約七千斤，蚕豆約五千斤。我把這些生莖葉，平均撒佈在一甲地的田面上。結果去年第一期作，比往年增收約一千壹斤（一甲地收量七千四百壹斤），穀粒飽滿，同時土壤也比較往年鬆而軟。我希望各位農友兄弟，在本年第二期作水稻收穫以後，多多種植綠肥，以提高產量，改良土壤。我的栽培方法，簡單的列舉於下：①大菜花栽培法：在第二期作水稻收穫後，作寬約三分公分的畦，大菜種子摻和細堆肥，每隔五十分公分左右點播。要注意排水，播種後二十五天左右，施用一次的人糞尿。等到次年二三月花盛開，下部的角果稍充實時，刈割入土中，作為肥料。②蚕豆，第二期作水稻收穫後，作寬約二公尺的畦，行距六十五公分，株距三十五公分。每穴點播三粒種子，上面覆以四公分的堆肥。蚕豆不須多施肥料，只在生長初期施一次少量的人糞尿，並耕除草一次即可。次年第一期作插秧前十天，即可刈割平均撒佈於田上，剉起作為肥料。

(七) 適期的收穫

甘藍的成熟期依品種略有不同，如成功甘藍，從糊仔栽植後約八十五天，糊仔栽植後，如發現有缺株，應隨時補植，儘量於一星期內補植好。菜苗在糊仔間（即水稻被覆期間），如發生夜盜蟲等害蟲，可用砒酸鉛粉劑，撒佈防治。培土整畦後，注意田間的水分，旱時應酌予灌溉，雨天時應注意排水。中耕儘量於菜苗幼小時舉行，株形增大後不宜中耕，又在葉球結球期尤其是收穫期，往往因水分過多，引起葉球破裂，所以要設法保持適量水分，使甘藍葉球正常發育。


(八) 害蟲的防治

為害糊仔甘藍的主要害蟲，有斜紋夜盜蛾蟲，蚜蟲，和菜心螟最為厲害。防治這類害蟲，要從育苗時期開始。防治菜心螟可以用DDT二五%乳劑，五〇〇—一六〇〇倍液；或用BHC六.五%可濕性粉劑，五〇〇倍液；噴射於甘藍葉面。蚜蟲類可用魚藤精乳劑五〇〇倍液劑防治。育苗期間須注意害蟲發生情形，按害蟲種類用DDT或魚藤精等，每隔一星期噴射一次。甘藍定植的前一天，一定要詳細觀察害蟲發生情形，再噴射一次，以免菜心螟或蚜蟲等害蟲帶入本圃中。定植後仍須要每隔十日左右，噴射藥液一次。

(四圖) 各次追肥的位置

農村福音

經濟部中央標準局專字第200號特准專利十五年的最理想「乘穀碾白機」現已出品了



節省勞費 在家碾米
不經脫殼 直接碾白
所得糠末 足抵機耗
堅固輕便 經濟實惠

特 點 使用 方法

腳踏型，每次用谷十一至十五斤，一分鐘約三百個轉，僅需二十分鐘即可變成白米，若要腳踏更輕，則一次投入谷十斤，腳踏十分鐘，後，全部取出，再投入谷十斤，同樣亦踏十分鐘，即成白米。且可兼裝製麵機兩用。

又動力用，每次投入谷十正臺斤或二十五臺斤，或五十臺斤計三種，馬達用半馬以上即可。

如蒙賜顧 無任歡迎

農具製造 重茂行
批發零售 臺中市區民權路四六號
電話：一九一八號（轉）