



圖文藝家 劉 綱

年豐

年四十四國民華中 曆月家農份月一十

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	十月十七
初二	十一	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	星期日
二	一	日	六	五	四	三	二	一	日	六	五	四	三	二	星期日

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	十月十七
十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	星期日
三	二	一	日	六	五	四	三	二	一	日	六	五	四	三	星期日

水稻

北都：（臺北、基隆、新竹）連寒種中甸收穫，在來種本月下旬收穫完畢。收穫後稻谷日曬五六天，充分乾燥，以風車淨淨，除去夾雜物，貯藏。收穫後及早耕犁翻土。

東部：（花蓮、臺東區）花蓮區上甸、中甸收穫完畢；臺東區連寒種上、中甸收穫完畢；在來種下甸收穫完畢。臺東區早中熟種作地收穫後，立即整地，播種小麥。

中南部：至中甸全部收成完竣。收成時低刈，裏作田稻株，自地下一二英寸部位鋤起攪散，以防止螟蟲發生。

小麥

①翻耕：刈稻後，從速施下半量肥，即時撒開稻葉，連連施下半量肥料，如有腐熟土糞蓋上更好。

②播種：播種後十五天（蓬萊種）要撒種，放在播種機後，然後以螺絲車或各條行間犁起，以便追肥後即時培土。③每公頃肥料總用量：硫酸銨三〇〇—四〇〇公升，過磷酸鈣二五〇—三〇〇公升。

甘蔗

大冬甘蔗：莖葉過於繁茂的，多行一次翻耕。

糊仔甘蔗：行播後三〇天左右，第二次培土。輕鬆土填入中，但不可過多。如土地過乾時，適量澆灌。

四四—四五年期：①各地區一律中耕、除草、澆灌。②九月十月上中旬的施第一次追肥。

③二期糊仔及看天田糊仔甘蔗水澆業已收穫，需仔細中耕碎土並施第一次追肥。④生長良好的蔗園（少缺株、無嚴重的病蟲害的園），才可以留宿根。收穫後立即開始清理蔗園，進行宿根作業：⑤削平蔗頭（用鋒利的鋤頭或曳引機），⑥兩側開根（用牛犁或五—二〇公分（五—七英寸）五—二〇公分（五—七英寸）株間排土，⑦施肥，⑧施BHC，⑨行間株間中耕，⑩用蔗頭分株補植，⑪充分澆灌。

棉花

①六月播種的，繼續分批採收籽棉，分別好壞，

黃麻

應在規定採種區收穫截止前，應注意會繳售。②採種採種時，脫粒曬乾閉貯貯藏。③浸麻池，換澆清水，可利用飼養吳郭魚。

第二期耕作：

①開播較早的，開始收穫。

②發芽後兩個月的，應除雜草培土，注意不要鋤動株旁泥土。③發芽後三個月，停止中耕，刈除高大雜草，拔除病死株燒燬。

④冬茶不宜採摘，否則採摘過度有傷茶樹元氣，尤其幼齡茶樹，不但會影響其生育，且將使其衰老。

⑤茶樹修剪應即開始，發育正常者可剪去老枝（剪去五、六公分）如較衰老者應行深剪（剪枝深度為剪去二〇公分左右）過於衰老者（本省小葉種）應行重刈，若為印度種宜行深剪（可剪去八—十二公分）。

⑥繼續深耕，⑦預備明年種植的土地應即行耕犁除草，劃區做畦，以待明年種植。⑧改良農機農具等繼續除雜草。本月可能會發生應注意。⑨苗圃除草培土。

十月月份曆正：魯水播種量應為二七—五四英斤。

落花生

採摘過度有傷茶樹元氣，尤其幼齡茶樹，不但會影響其生育，且將使其衰老。

⑤茶樹修剪應即開始，發育正常者可剪去老枝（剪去五、六公分）如較衰老者應行深剪（剪枝深度為剪去二〇公分左右）過於衰老者（本省小葉種）應行重刈，若為印度種宜行深剪（可剪去八—十二公分）。

⑥繼續深耕，⑦預備明年種植的土地應即行耕犁除草，劃區做畦，以待明年種植。⑧改良農機農具等繼續除雜草。本月可能會發生應注意。⑨苗圃除草培土。

十月月份曆正：魯水播種量應為二七—五四英斤。

茶

注意預防。拔除病株病枝或埋掉，接觸病株的手指衣服用具等都應用肥皂洗淨消毒，以防傳染。②早種茶草於本月中旬即可「摘心」。生育中等的，在花序與頂葉尖相齊時摘心；生育旺盛的，以開第一朵花時摘心為宜。工作前後手和用具都要用肥皂洗淨。摘心後可略減少田間澆灌。

③摘心後容易發生脫牙，應隨時注意一一摘除。至遲，芽長不得超過四寸。④焙茶室應早加檢查，以儘早修理為宜。⑤焙茶燃料亦宜早日準備，以免含水過多，不易燃燒。

菸草

①多果防止西晒
②今年秋植鳳梨園，中耕除草一次。③每千株施用硫酸銨一三—六公升，撒施下高磷肥。今年秋植鳳梨園不必施肥。

①抽類，葡萄柚
②冬季修剪：剪除病弱枝有病蟲害

養鷄

多數鷄隻，仍在換羽期中，產卵減少，應給與富營養而易消化的飼料。成績不良的母鷄，此時淘汰。小母鷄初產期應給與足量富營養的飼料，以免影響將來產卵成績。鷄舍須勤場經常保持清潔。防止鷄群，白喉，及感冒等疾病的發生。

養鷄

多數鷄隻，仍在換羽期中，產卵減少，應給與富營養而易消化的飼料。成績不良的母鷄，此時淘汰。小母鷄初產期應給與足量富營養的飼料，以免影響將來產卵成績。鷄舍須勤場經常保持清潔。防止鷄群，白喉，及感冒等疾病的發生。

養鷄

多數鷄隻，仍在換羽期中，產卵減少，應給與富營養而易消化的飼料。成績不良的母鷄，此時淘汰。小母鷄初產期應給與足量富營養的飼料，以免影響將來產卵成績。鷄舍須勤場經常保持清潔。防止鷄群，白喉，及感冒等疾病的發生。

預防感冒

在這一二月天氣年涼還暖，氣候轉變幅度最大的時期內，許多人起居稍一忽略，就着了涼而染到感冒，甚至影響健康。感冒是一種傳染性的疾病，當你身體抵抗力稍差時，牠就會找到了你。起初使你喉嚨發癢，也許有微弱的疼痛，其他現象是流鼻涕，食慾不振，精神不爽快，頭痛，甚至發熱咳嗽。雖然感冒不是太嚴重的疾病，但在兒童可能引起枝氣管炎、肺炎，有時也會變成中耳炎，以致耳痛或流膿，而冬季嬰兒腸炎有百分之二十是因感冒而起，所以感冒是不能不注意的。

預防感冒最要緊的是注意氣候的突然轉變，穿著的衣服應隨氣候而調節，那就是說當天氣稍涼或是在戶外時，應該添加一些衣服；當天氣稍熱或在室內時，就應脫去一二件，這雖是麻煩的瑣事，但如能養成這個習慣，那麼有感冒的機會是會減少的。做母親的千萬不能因為怕麻煩就給孩子穿許多衣服，要知穿衣服穿得太厚，流汗以後再脫衣服是最容易感冒的。

當感冒流行時，盡量避免進入公共場所。家中如有人感冒時最好隔離，咳嗽，打噴嚏時一定要用手帕掩蓋口鼻，以免傳染，同時應休息，多喝開水，如病況嚴重時應請醫生診治。