


怎樣種植馬鈴薯

廖 梅 桂 一




(形情育發薯鈴馬) 照良好的冷涼氣候，本省秋冬季低溫時，最適宜生長。排水良好而肥沃的砂質壤土最為適合，粘質土地，不適合塊莖生長，生產塊莖的品質也較差。

本省除高冷地可以春作栽培外，水田地帶，可利用第二期水稻收穫後，到次年第一期插秧前的冷涼期間，做秋冬水田裏作。中部地區的氣候，雖然從十月起馬鈴薯即可生長，但水田裏作栽培，以十一月中旬為最好的播種時期。

(一) 品種和種薯處理

本省過去從外國引進試作的品種，其中以「男爵薯」最適合本省氣候風土，栽培容易，產量豐富，品質優良，頗受一般農友歡迎。如要引進新品種，需先行試作。日本來的種薯，應選用日本北部的（例如北海道產的）最好，不可用市場販賣的食用薯做種薯。種薯須選中形塊莖，重約八十到一百公分。種薯用福爾馬林（ホルマリン）一百倍液浸漬一小時，或烏斯勃龍（Uspulan）七百到一千倍液，浸漬半小時消毒後，清水洗淨陰乾。縱切成小塊（圖一），每塊重約二十公分以上，帶一二芽眼，並用糠殼灰或硫黃粉塗抹切口，放



對：左 不：右 法切的薯種 (一圖)

第二期水稻收穫後，先把水稻田耕起，如能深耕耙好，耕後經一十二日，待土壤稍乾時，再用刈耙及手耙碎土並耙平田面。以後做四尺平畦（包括畦溝在內），每畦內開兩條植溝（圖二），深約四寸左右。先施下基肥於植溝內，隨即用鋤頭充分混入土中，略為耙平溝底，而後用糠殼灰於植溝內，每隔一臺尺點放若干。種薯芽眼向上，平放糠殼灰上面（圖二），然後掘起畦溝細土，掩蓋種薯，順便整畦形。全區種好後，隨即灌溉。各畦濕潤時，再行排水。

(三) 如何使用肥料

馬鈴薯是短期作物，生育期間大約三個月，所以宜用速效肥料。施用肥料種類和施肥量，依各地情形不同。茲舉一例如下（一〇公噸施肥量）：硫酸銨，五十六公斤；過磷酸鈣，四十公斤；硫酸鉀，十六公斤；堆肥，一千五百公斤。栽植時，堆肥全量和其他肥料的半量做基肥，施用於植溝（圖二）。剩餘肥料分做兩份，播種後每隔三十日施用一次，作為追肥。第一次在行間開溝，肥料施用於靠近植株的溝底兩邊，施用後隨即蓋土。第二次於株間掘穴施用（圖三）。如能加用人糞尿做追肥，可以提高塊莖品質及產量。

置於冷涼處所。經過二三日，等切口乾燥，切傷稍癒時，就可以種植。

(二) 整地、作畦、種植

洋蔥葉枯病、腐敗病等一切病害特效藥

裕米農乳劑·鐵劑·石灰
△最新超強力殺蟲劑（滅除一切害蟲）
霸拉吉旺E.P.N.水和劑

△野鼠用最強力殺鼠劑△有利的鼠拉倒爾

西洋松茸菌絲

(四) 優良蔬菜種子

◎洋蔥葉枯病、腐敗病等一切病害特效藥
裕米農乳劑·鐵劑·石灰
△最新超強力殺蟲劑（滅除一切害蟲）
霸拉吉旺E.P.N.水和劑

△野鼠用最強力殺鼠劑△有利的鼠拉倒爾

西洋松茸菌絲

臺灣農產企業公司

臺北市迪化街一段二五六號

郵政儲金局臺北一九五三電話：四四二五三

臺中縣經銷處：豐原鎮富春街五五號

彰化縣經銷處：溪湖鎮光華里三三號

陳昂商行

華美商行

又多施堆肥，能使土地鬆軟，有利塊莖的發育。施用追肥時同時行除草培土，可以節省勞力。

(四) 發芽後的管理

栽植後芽伸出地面時，應注意防治夜盜蟲。由芽眼發生的莖，不宣摘除，如能發生三莖以上，可能增加收量。塊莖形成的發育時期，施行培土，二次，以防塊莖露出地面。又久旱時應灌溉供給水分，下雨時應注意排水，其他除草等工作，看實際