

情形酌量舉行。

(五) 收穫和產量

馬鈴薯種植後經過九十五日左右，莖葉逐漸變成黃色，塊莖的表皮較不易脫離，這時可以開始收穫。

馬鈴薯的市價常有變動，早期應市，較為有利。收穫早期，用手摸取較大塊莖出售，市價較高。這種收穫法，因在生育期中舉行，必須小心，不宜損傷根部。莖葉枯萎時收穫，可能增加貯藏力。一般收穫可用大鋤，按株掘起，採收塊莖。

收穫要選晴天，注意不要損傷塊莖。收穫後塊莖須分級選別（掘傷薯另堆集一處）而後酌量出售。

，較為有利。本省水田裏作栽培馬鈴薯的產量，依土質略有不同，普通一分地可以收穫生塊莖一千到一千五百臺斤左右，最高可達二千臺斤。

(六) 病蟲害防治

馬鈴薯的毒素病和輪腐病，發病植株葉部均逐漸卷縮枯萎，不能恢復，終至枯死。茄科的植物（茄子、番茄、辣椒等），都可能傳染發病，所以栽培地須選未栽培過茄科作物的新地，或採取輪栽方法，和水稻輪作較為理想。

種薯可以傳染病害，所以要選用無病蟲害的優良薯，用上述方法浸漬消毒，切種薯時仍須注意消毒使用器具。發現病株，應該隨時將病株連土掘起

請農友收聽自己的節目

好農友廣播定本月廿一日開始

本社與省農林廳，臺灣公司，農復會和中國廣播公司，為了滿足廣大農村聽眾的需要，決定舉辦「好農友」廣播，自本月廿一日開始播出，節目內容不但切合農村需要，而且還非常精彩。另外，將要定期舉辦有獎測驗，凡收聽本節目的農友聽眾，都可以參加。測驗的問題，都是將來在節目中講過的事情，用通訊答覆，答得好的，可以得到很豐富的獎品。這是農友們自己的節目，請農友



(包國璋攝)

們注意收聽吧！

時間：星期一至星期六，每天晚上八時半至九時。

電臺及波長

- 中國廣播公司第二廣播 六六〇千週
- 臺中廣播電臺 九六〇千週
- 嘉義廣播電臺 一〇七〇千週
- 臺南廣播電臺 一〇〇〇千週
- 高雄廣播電臺 八九〇千週
- 花蓮廣播電臺 八六〇千週
- 臺東廣播電臺 八四〇千週

燒燬，並以五十倍福爾馬林液消毒病株跡地，以防腐延。

栽培期間，用三—四斗石灰波爾多液，每隔一〇—一五日噴射一次，可以預防馬鈴薯疫病發生。


塊莖表皮的病害（如茄皮病），用福爾馬林（ホルマリン）一百倍液消毒種薯，頗有效果。

發現夜盜蟲，用DDT二五%乳劑，配成四〇〇—五〇〇倍液劑，於晚間（八—十時）噴射防治，效果顯著。


生育期間可能發生的害蟲，有蚜蟲類和浮塵子類等。如發生蚜蟲，可以用魚藤精乳劑五百到八百倍液劑，每隔一星期噴射一次防治。

浮塵子類害蟲可用DDT二五%乳劑，五百到八百倍液，或DDT五%粉劑防治。

更正：本刊五卷二十一期第八頁「甘藍糊仔栽培」文內，第一節「前作栽培早生種水稻」，第六行正條種植的劃行標準（一八寸×八寸）應更正為（八寸×八寸）。



位置施肥和種植的圖 (二圖)



位置施肥的圖 (三圖)