



畜

## 優良小公鷄

### 怎樣選擇？

問：選擇小公鷄要注意那些條件？早熟冠大和體格較重，兩者如果不具備，那一方面更重要？（嘉義市福松里涂水龍）

答：小公鷄的選擇要冠大直立而且齊整，早熟，體格大，黃色素較濃也是健康的表示。選擇以上各要點宜都具有較為理想。不過在你所說的情形下，選擇早熟冠大者較合宜。

關於雞冠的齊整是指冠要有定型，如單冠的冠葉，缺齒要整齊，不能有亂七八糟大小不齊或有分叉等情形。（李登元）

### 多產母鷄怎樣選擇？

問：請問多產的母鷄怎樣選擇？

### （涂水龍）

答：多產母鷄鑑別的要點是：冠大紅柔軟，眼睛大、圓、光亮、凸出有神；胸廣，腹深，後臀部大而軟，耻骨間的距離要寬在三指以上，行動活潑等。寡產鷄則相反。請參看豐年五卷十三期七頁「怎樣選擇多產鷄」

。（省農業試驗所李登元）

### 兔的繁殖和哺乳期

問：①雌兔在懷孕以後，是否要和公兔隔離？

②母兔的懷孕有多久？產前要準備些什麼？

③幼兔的哺乳期要多久才可以離開母兔餵飼料？

④母兔在斷乳後多久可以再交配

？（新竹市張翹英）

答：①雌兔雄兔應分居，以一籠

### 捉兔子不宜提耳朵


問：捉兔子，一般人說可提耳

朵；也有人說不可以提耳朵，應該提背皮。究竟那一種方法是對的？

②兔子喜歡住在洞裡，用沒有日光照射的房屋來養兔是否適宜？（張翹英）

答：①捉兔子提牠的耳朵，未免虐待動物。捉時應該把手掌按下牠的耳朵，然後握住牠的背皮提起。

②養兔光線仍是必要的，不過在



### 用施樣怎該應素尿



日光不直射的房屋裡飼養比較合宜。（鄭謀平）

問：①尿素施用

時就須分開。雌兔也是如此，以免發情時互相傷害騷擾。只有在雌兔發情的時候，才把雌兔放在雄兔處讓牠交配。交配完了後，就應該分離。

②兔的妊娠期間是三十天。產前可準備一個木箱，作為巢箱之用，放入兔籠中，木箱的大小可照後圖。箱中須鋪稻藁。

③兔的哺乳期間是四十—五十天，打算將來作為種用的，可哺乳到五十至六十天。仔兔在出生二十天以後就會覓食飼料，這時每天可分幾次給些濃厚飼料和青草。

④母

兔斷乳後，大約一個月發情時候才可交配。

（省農業試驗所鄭謀平）



肥份流失？在排水不良的田地，要怎樣施肥才不致使

貯藏才不致於會受潮

濕？

③中等（八則）的田地尿素施用量怎樣？

④本省現有製造尿素的工廠有幾家？（南投縣水裡鄉張錦昌）

答：①施用尿素最好的辦法是把田裡的水先行排去，尿素施下後立即翻犁，這樣能最有效地減少流失。

②尿素應該用缸加蓋貯藏，就不容易損失。

③每公頃地（甲萬）可施用尿素二百公斤左右。

④臺灣肥料公司現在正在建造尿素工廠，一年以後就可以有生產。（省農業試驗所曾憲鼎）

### 建築用的石灰

問：可中和酸性土

問：市賣的建築用石灰可否用來中和酸性土壤？（嘉義縣水上鄉劉木坤）

答：市賣的普通建築用石灰可以中和酸性土壤。如果是由生石灰，在使用時須注意不可接觸作物。普通每公頃需要石灰一千至二千公斤。但如種柑橘或鳳梨不必施用石灰。（曾憲鼎）

# 歐羅肥

相同的一年的	
不用歐羅肥	

情形全不同！

四種包裝：100公分  
1磅  
2磅  
50磅  
郵購一磅起，每磅台幣42元。  
郵政劃撥號碼金第 12550 號  
新臺畜牧獸醫服務社  
臺北市中山北路一段三十五號二樓