



秋鳥圖 蕭野基攝

年豐

年四十四國民華中
曆月家農份月二十

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
初二	初一	三十	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二〇	十九	十八
四	三	二	一	日	六	五	四	三	二	一	日	六	五	四
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	初十	初九	初八	初七	初六	初五	初四
六	五	四	三	二	一	日	六	五	四	三	二	一	日	六

水稻

北部：(臺北區、新竹區)第二期作水稻，本月期作水稻，本月期完全收穫完畢。稻田跡地，一律用犁翻土，使土壤充分風化。並於農閒時，以人糞尿液肥，澆于已翻翻之土面(每十公畝約十擔)，以便土壤吸收，徐徐分解；而為來一期作水稻的基礎。種植紫雲英的田土，以能接種根瘤菌。生長不旺，可略施稀薄人糞尿。

東部：(臺東區、花蓮區)冬閒田地，翻土澆肥，與北部同。種植紫雲英的田土，本月月上旬，行第一次中耕追肥並培土。

中南部：①播種：高雄地區十二月二十五日，臺南地區十二月下旬。

②選種：以泥水(參看本刊三卷十四期)或鹽水選充實優良穀種，每公頃三〇—三六公畝。

③消毒：浸水前用殺菌藥生二千倍(〇.〇五%)浸漬一小時，防治病害，嗣後浸種四天。

④催芽：(參看本刊三卷第二期)，催芽至根長為較長的兩倍，芽長與葉長相等。

⑤秧田：(參看本刊四卷第三期)應做臺中式改良秧田，整地前每分地施下腐熟堆肥六百一千公畝，硫酸銨與過磷酸鈣各四〇公畝，氯化鉀二〇公畝。

⑥播種：每平方公尺播種量約一公畝(約八毫)，必疏播，可能增收。每公頃需要播種三、三公畝。

大多甘諸自中甸起，可以分批收穫，糊仔甘諸，照常管理。

甘蔗

①選定鍾度(步留)高的蔗園，或病蟲害嚴重的蔗園，先行收穫。

②不準備留根的蔗園，收穫時可從節蘆頭(蔗頭)掘起。預定留根的蔗園，頂多留十分公畝。

四五一四六年期

③各地區一律舉行中耕除草與灌溉。

④七、八月種植的可以人工代替培土，其高要沙土、沙壤土為六公分，壤土與粘土為四公分。

⑤生長良好的蔗園(少缺株、無嚴重病蟲害的)，才可以留宿根。參看十一月月份曆。

④各契約蔗園多行間作，落花生與米豆收穫後，應翻入土中。勿即行培土，間作物收穫後，同時施以堆肥肥及化學肥料。

落花生

第二期秋作

①剪枝或合刈可繼續進行。

②修理並整理製茶用具及農具。

③發衣蟲等繼續除。注意蛀心蟲、鐵蝨及白蟻等防治。

④明年擬種植樹的土地應行耕犁，除草劃區整地。

本月已入採收期

茶時期應注意：

①切忌採收未熟茶葉。

②雨天後應再隔二三日晴天再行採收，有重露時，亦應待乾後再採，尤其下部茶葉更應注意。

③遇寒流侵襲，應待天氣暖一二日後再採。

④採茶時應注意乾燥室容量，以免過多或過少。

⑤四坪室最好採收二萬五千葉至三萬葉。

⑥已採茶葉勿使日曬、吹強風或攪攪過久而致凋萎。

⑦車聯及吊掛時應選別於茶葉大小等分別串掛。

⑧乾燥室內應用小等分別串掛。

⑨生長旺盛及熟度不足等含水量較多的茶葉，黃變及色澤固定溫度都要較低，昇溫亦須稍慢。

⑩溫度達50°C時應于茶葉下張掛金屬網一層以防火災。

⑪中曾乾燥期較適溫度勿超過120°C。以防於葉發紅脫脫。

⑫卸茶前勿使過分吸濕，尤以第二次第三次所收茶葉最要加倍留意，至少要保持中骨尚易折斷的狀態。

⑬捆包貯藏必須注意貯藏場所，要選濕氣不易侵襲之處，貯藏中亦要隨時注意有無濕氣侵襲。

注意環境衛生

環境就是我們生活的所在地，我們時時都與環境發生關係的，如果環境清潔衛生，疾病的傳染機會就沒有了。改善環境衛生必須從個人和家庭做起。這裡告訴你一些個人及家庭改善環境衛生應做到的事情。

①我不隨地吐痰，將痰吐在紙巾中，用火燒去(最好煮沸後再洗)，或吐在紙巾中，用火燒去。

②我不隨地拋棄果皮紙屑或垃圾，養成將廢物丟入垃圾箱內的習慣。

③我不在馬路邊或牆角內隨處小便。也不使兒童在地或水溝裡大小便。

④個人衣、被、鞋襪以及各種用品，用後都收藏整齊。

⑤我的房間地面天花板經常保持清潔，門窗玻璃常擦洗清潔。窗戶常開。保持空氣流通，光線充足。

⑥我家的庭院每天都洒掃，水溝常疏通暢通。

⑦我家有垃圾箱，箱上有蓋蓋緊。

⑧我家廁所常打掃，並用消毒藥水去沖洗地面。便器上有蓋。

⑨我家的家禽與牲畜都與我們的住所保持距離，常打掃保持清潔。

⑩我家的疊席及衣被等用具常搬至日光下曝曬。倉庫及不用的堆積物也常整理清潔。

黃麻

①麻種自留的清潔曬晒，繼續貯藏於密封容器，取便全備種仁曬乾，貯藏於密封鐵箱木箱或陶罐等容器，留待明春播種。

棉花

全部籽棉採取完，運農會繳售。田間拔除棉株，即可種後作物。

茶

①剪枝或合刈可繼續進行。

②修理並整理製茶用具及農具。

③發衣蟲等繼續除。注意蛀心蟲、鐵蝨及白蟻等防治。

④明年擬種植樹的土地應行耕犁，除草劃區整地。

菸草

本月已入採收期

茶時期應注意：

①切忌採收未熟茶葉。

②雨天後應再隔二三日晴天再行採收，有重露時，亦應待乾後再採，尤其下部茶葉更應注意。

③遇寒流侵襲，應待天氣暖一二日後再採。

④採茶時應注意乾燥室容量，以免過多或過少。

⑤四坪室最好採收二萬五千葉至三萬葉。

⑥已採茶葉勿使日曬、吹強風或攪攪過久而致凋萎。

⑦車聯及吊掛時應選別於茶葉大小等分別串掛。

⑧乾燥室內應用小等分別串掛。

⑨生長旺盛及熟度不足等含水量較多的茶葉，黃變及色澤固定溫度都要較低，昇溫亦須稍慢。

⑩溫度達50°C時應于茶葉下張掛金屬網一層以防火災。

⑪中曾乾燥期較適溫度勿超過120°C。以防於葉發紅脫脫。

⑫卸茶前勿使過分吸濕，尤以第二次第三次所收茶葉最要加倍留意，至少要保持中骨尚易折斷的狀態。

⑬捆包貯藏必須注意貯藏場所，要選濕氣不易侵襲之處，貯藏中亦要隨時注意有無濕氣侵襲。

蔬菜

一、播種：①頂播者：蘿蔔(拔仔)和冬瓜(白甜不在內)，葫蘆、燕窩、根菜、豆莢(限中南部)，牛蒡、馬鈴薯、芋、薑(限中南部)。

②卷心菜(也可叫捲心菜)，白菜(限日本品種)，油菜、菠菜(指大葉種，亦可叫捲心菜)，番杏(多葉菜，也可叫捲心菜)，指本地種，也可用床播或移種。

③分蘖：胡瓜(多葉大胡瓜及節成種)，越瓜(南部)，西瓜(南部)，冬瓜、南瓜、扁蒲、苦瓠(限中南部)，菜薹、菜豆(限中南部)，黃秋葵。

鳳梨

①多果防止果實腐爛。

②巡視風害。

鳳梨，如發現有粉介殼蟲及凋萎病，可用八百倍富粒多液每株灌心葉中三百CC 區應用。

柑橘

①自本月份起至二月底止為本期定植適期。

②定植前一個月掘栽孔直徑一公尺，深〇.七公尺，施入腐熟堆肥二五公畝。

③栽植距離：柑、橙五公尺×五公尺；柚、葡萄柚七公尺×七公尺，甜橙、檸檬六公尺×六公尺。

④植後充分灌水，以後時常灌水，直到雨季。

⑤採收柑、橙、華盛順、檸檬、葡萄柚。

香木瓜

①中耕除草一次。

②施肥，每株施硫酸銨五〇公畝過磷酸鈣一〇〇公畝，硫酸鉀四〇公畝，堆肥三〇—四〇公畝。