


剪修的樹果類橘柑



(型圖成剪修常過經)

戴邦本

柑橘類果樹的修剪方法，同柑橘的生育和果實產量有很大的影響。適當的修剪，可以改良枝幹系統，促進發育和結果的平衡。假如修剪過度，幼齡樹要延遲結果，成熟樹的果實產量也會因此減少。

柑橘類每年只作一次冬季修剪，要比不定期修剪來得好。本省各地，因氣溫較高，雖然在冬季修剪，也不致於發生寒害，所以修剪適期較長。普通在休眠期、生育遲緩的冬季、春芽發生以前，都可以修剪。但是以春芽萌發以前，每年一、二月間，最為適宜。徒長枝和衰弱枝，很容易發生，全年任何時期都可酌量剪除。

一、修剪和果實產量

柑橘樹的內部，常有許多枯枝殘留。如果不加以剪除，對採收、病害防治、新梢發育、內部結果等，都有不良影響。凡是枯枝，應該全部剪除，弱枝也有剪除的必要。

如果把發育正常的柑樹的強健枝條剪去，就常常會發生果實的減產。事實上發育正常果樹的修剪，對果實產量、大小和品質，都很少有增進的效果。如果有必要，也只能作很輕微的修剪。凡患有病

害或其他災害的果樹，可以看實際情形作不同的處理。例如柑橘常常因雨水或灌溉水過多，根部受到損害，而發生萎凋，遇到這種情形時，最好重剪。病害、蟲害、風災、藥害發生後，為使果樹早日恢復正常發育，應當避免修剪。為使樹形整齊劃一，或使樹形矮化的修剪，都會使果實產量減少。栽植距離過近，引起發育不良時，也不要利用強剪去矮化樹株，最好的方法是挖除一部份過度密集果樹，以增進樹間的寬度。正常果樹的強健枝條，如果和老枝交錯，可把枝條互縛，使它向下，或拉到樹的外方，這樣就可以避免剪除太多的枝條。


二、理想的樹形

柑橘樹如果聽其自然發育，會形成枝條分佈不均，外部枝條長短不齊的樹形。理想的樹形，要接近圓錐狀，外表凹凸相差不過大。


主幹要短。四週的枝條下垂，當結果時，以果實不和地面接觸為原則。短幹有不易遭受風災的優點。過圓下垂的枝條，能蔽蓋地面，減少土壤水份的蒸發。密生的葉，可以保護枝幹，避免強烈的日照，對散佈藥劑也有方便。

三、幼齡樹的修剪

在苗圃期間，芽接癒合處下方的芽，應當隨時全部摘除或剪除。接合處上部的芽，就要全部保留，用來促進幼苗的生長。苗木定植前後，可以在離



形情配支育發幹枝後剪修



(枝主為4至1)準標剪修期齡初不

農業新時代到了！

請用效力特強的新農藥

△洋蔥、蒜苗、菸草、馬鈴薯、葉枯病、立枯病、腐敗病、霉病等一切病害特效藥

△稻熱病、苗期特效藥

△最新超強力殺蟲劑

△福米農石灰

△霸拉吉旺

△有機磷安全新藥、滅蟲聖藥

△馬拉松乳劑

△防鳥、捕鼠、驅兩得の力スミ網

△春季優良蔬菜種子

△美國加州大蕃薯

△大九和西瓜

△其他各種種子、農藥、肥料、日用品、五金、農具等均有代售

臺灣農產企業公司

直營部 臺灣農產企業公司

郵政劃儲臺灣一九五三 臺北通化街一四二五六號 電話四四二五三

地面一、五、二尺的地方，切頂部，在切頂的主幹上，接近頂部的地方留四、五個芽，用來養成未來的主枝。主枝間的距離，最好是二、三寸，如果相距過密，分枝點就容易開裂。如果主枝過多，樹株上部的枝條就容易發生直立傾向，結果數目減少，並且容易發生徒長枝。如果樹勢衰弱，可以酌量增加留芽數，用為預備枝。等到發育轉旺旺盛時，再疏除一部分。以後就可以讓苗木自由生長。當所留主枝長達一尺時，就要把每枝頂端剪除，使它