

法方種兩的雞雛養飼



手培元

自己的母雞生出的雛雞，在飼養和管理上，都比較容易。但是如果各位農友，從其他的地方買來雛雞飼養，就常常因為不識飼養管理法，致使雛雞發育不良，或死亡，而遭受到很大的損失。本文介紹買來的初生雛雞的飼養管理法，以供農友們參考。

(一) 雛雞的管理

買來的初生雛雞，可以用天然育雛法，或人工育雛法飼養。農友們可以看實際情形，任意選擇一種。

1. 天然育雛法

天然育雛，是用賴抱母雞來帶雛雞的方法。賴抱母雞就

是生完一次蛋後，正想抱蛋的母雞。大小適當的一隻母雞，約可帶領十五—十八隻的雛雞。當母雞已能賴抱時，分兩步來訓練牠帶領雛雞：
①假抱蛋：用二—三枚普通蛋或無精蛋，代替好的種蛋給母雞抱，約經七—十天以後，就可做正常的帶雛母雞了。為了防止抱蛋變壞，每天晚上應把這種抱蛋移出，另外換上其他的抱蛋，這樣母雞所抱的蛋就不會變壞，取出後仍可煮食。
②帶雛雞：在晚上或黑暗中，先把二—三隻初生雛雞，很小的放到經過假抱蛋訓練的抱蛋母雞的翅膀下。如果母雞沒有不好的反應，其他的雛雞就可以漸次放入了。全部抱蛋可在此時取出。母雞餵給粒餌，飲水可和小雞同時給與。當小雞長到六星期大時，就可和母雞隔開。

2. 人工育雛法

人工育雛法，是用雞箱飼養雛雞的方法。

一個良好的育雛箱，應能保持適當的溫度、足夠的通風，並且容易消毒清潔。在雛雞羽毛還沒有充分長成以前，應該注意保溫工作，同時也要注意通風。如果只注意保溫而通風不良，就會減低雛雞的活力，而增加雛雞的死亡率。育雛箱應隨時保持清潔，最好每日清潔一次。箱底如果

不是用鐵絲網做的，可利用舊報紙鋪在箱底，時常更換，以保持清潔。出生後一星期以內的小雞，不管箱底是不是用鐵絲網做成，都應鋪放一層舊報紙，以免雞腳踏入網眼而受到損傷。

育雛箱的大小，要看雛雞的大小、多少而決定。如果過擠，就會妨礙小雞的生長，和羽毛的成長，並且也會引起啄食羽毛的惡習。普通每四平方尺的育雛箱，可飼養：初生到三星期大小的小雞三十隻，三星期到六星期大小的小雞十五隻，六星期到八星期大小的小雞八隻。如要飼養三十隻左右的雛雞，可利用木箱或板紙箱做成育雛箱。

保溫以用電池比較安全而方便。其他，也可以應用煤油或木炭來保溫，但要注意火災和煤氣中毒。保溫不要太高，如果太高，就容易生病以至死亡。我們可以從雛雞的生活情形看出保溫是不是適當。如果溫度太高，會使雛雞喘氣，同時因要避開熱氣，常常擠在一個角落裡。太冷時也會同樣堆在一個角落，或擠在燈罩下。如果保溫的溫度很適當，雞群就在育雛箱內均勻散佈，有些把頭頸伸長睡覺，箱底的雞糞也會散佈均勻。



論醫；伊悔欺卜都人人，字識應為因福阿 (三) 是字識應，站一過站一車火 (二) 明寫乾未漆油，景光好正真園公 (一)
。二千寫千二明明，據寫收錢借 用無)工採無算賢福阿；慘正真 目，(用中不)用路無字半識(不)應；明
。站過坐經已到算，(處 •(明失)明育那像相(好睛眼)金

潮濕的草葉而受涼。並且要注意狗、貓等動物的加害。出生後六星期，如果氣候變冷或陰雨，還是要放進育雞箱中，以避免因受冷而生病死亡。

(二) 雞的飼料

雞，在出生後的頭一個星期，最好飼給粒餌。粉餌就較不適宜。出生三天以後，可在箱頂掛一把很嫩的青菜，供給小雞啄食。第二週到第八週，可以改餵粉料，可按照下表配合：

玉蜀黍三十三%，米糠六·七%，麩皮十%，豆餅二十三%，花生餅十二%，魚粉八%，骨粉三%，貝殼三%，食鹽一%，魚肝油〇·二%。

魚粉中如果含有鹽分，上表中一%的食鹽可以不要供給。這些飼料以外，要另給青菜，以容量計算，每二份的粉料和一份的青料混合餵給。此外如能加些維生素(約〇·二%)，在飼料內，也是很有益的。

除乾飼料外，也可餵給濕料。把上述的混合飼料，和一些水攪拌，就成為濕料。飼料每天分四次給食。每次的飼料量，以雞群在半小時內能吃完為最適宜，如果太多，便會堆積腐敗，雞吃了會不好。

市上有小魚或什魚類——這種小魚或什魚類煮熟給飼。如魚內臟、魚屑骨肉等出售。但是如果用腐敗的魚，就會使在雞出生後四星期時，可以把雞中毒而死亡。

青蒜 蒜球 蒜苔 陳文郁

蒜喜歡輕整而肥沃的砂質壤土。在酸性土壤或排水不良的粘質地生育不佳。普通食用蒜的地下部份，叫做蒜球。蒜球可以用來繁殖。採食幼嫩的蒜葉，叫做青蒜。現在本省栽培的主要品種有埔蒜、黑葉蒜、花蒜等三種，品種特性如下表：

品種	用途	球形	球面	莖葉	蒜味	產量(分地)
埔蒜	兼用	小	稍平	稍細	強	1500
黑葉蒜	兼用	大	不平	稍粗	中	1200
花蒜	兼用	大	平滑	稍粗	稍強	1100

種植用種球繁殖的適期在八月至九月(青蒜)及十一月(種球用)。

作高畦，畦幅約一二〇公分，用腐熟堆肥當基肥，一分地約施用二，〇〇〇公斤。整地時先把堆肥耕入土中，然後打鬆土壤，耙平畦面。整地後，以行距株距各十公分的植距，密植蒜球。普通一分地約需種蒜五〇公斤左右。蒜球種植後，覆土厚約三公分，再覆草。以後在土壤乾燥的地方，應隨時灌水。播種到發芽，約需十五天左右。除草應按時施行。追肥可用人糞尿，一分地約用二，〇〇〇公斤，分四次施用：第一次在幼苗約三寸高時施行，以後每十五日施行一次。生育期中，應該注意灌水和排水，並防除蔥薊馬為害。青蒜的採收期，約在十二月到一月。蒜球的採收期，約在三月到四月。採收後的蒜球，可放在屋內通風優良的地方涼乾貯藏。


蒜苔就是蒜的花穗。本省只有花蒜一種能產蒜苔，其他品種都不能抽穗。蒜苔的栽培方法，和普通蒜相同。在抽苔後，還沒開花時採刈。採苔後的蒜株，仍然可以留作蒜球採收。



(四) 阿福腳踏車去市，連日大雨，崩裂為因(不)看告示，落(下)深坑險(一)點死！



(五) 阿福受傷入院，醫生勸伊(少)想回中(院)讀書，時年最少，做人最！



(六) 阿福知(道)識(好)字，但無聞(無)人，小(為)弟無(願)，(可)以(去)學(無)暇！阿福糊塗！