

法方種兩的雞雛養飼



手培元

自己的母雞生出的雛雞，在飼養和管理上，都比較容易。但是如果各位農友，從其他的地方買來雛雞飼養，就常常因為不識飼養管理法，致使雛雞發育不良，或死亡，而遭受到很大的損失。本文介紹買來的初生雛雞的飼養管理法，以供農友們參考。

(一) 雛雞的管理

買來的初生雛雞，可以用天然育雛法，或人工育雛法飼養。農友們可以看實際情形，任意選擇一種。

1. 天然育雛法

天然育雛，是用賴抱母雞來帶雛雞的方法。賴抱母雞就

是生完一次蛋後，正想抱蛋的母雞。大小適當的一隻母雞，約可帶領十五—十八隻的雛雞。當母雞已能賴抱時，分兩步來訓練牠帶領雛雞：
①假抱蛋：用二—三枚普通蛋或無精蛋，代替好的種蛋給母雞抱，約經七—十天以後，就可做正常的帶雛母雞了。為了防止抱蛋變壞，每天晚上應把這種抱蛋移出，另外換上其他的抱蛋，這樣母雞所抱的蛋就不會變壞，取出後仍可煮食。
②帶雛雞：在晚上或黑暗中，先把二—三隻初生雛雞，很小的放到經過假抱蛋訓練的抱蛋母雞的翅膀下。如果母雞沒有不好的反應，其他的雛雞就可以漸次放入了。全部抱蛋可在此時取出。母雞餵給粒餌，飲水可和小雞同時給與。當小雞長到六星期大時，就可和母雞隔開。

2. 人工育雛法

人工育雛法，是用雞箱飼養雛雞的方法。

一個良好的育雛箱，應能保持適當的溫度、足夠的通風，並且容易消毒清潔。在雛雞羽毛還沒有充分長成以前，應該注意保溫工作，同時也要注意通風。如果只注意保溫而通風不良，就會減低雛雞的活力，而增加雛雞的死亡率。育雛箱應隨時保持清潔，最好每日清潔一次。箱底如果

不是用鐵絲網做的，可利用舊報紙鋪在箱底，時常更換，以保持清潔。出生後一星期以內的小雞，不管箱底是不是用鐵絲網做成，都應鋪放一層舊報紙，以免雞腳踏入網眼而受到損傷。

育雛箱的大小，要看雛雞的大小、多少而決定。如果過擠，就會妨礙小雞的生長，和羽毛的成長，並且也會引起啄食羽毛的惡習。普通每四平方尺的育雛箱，可飼養：初生到三星期大小的小雞三十隻，三星期到六星期大小的小雞十五隻，六星期到八星期大小的小雞八隻。如要飼養三十隻左右的雛雞，可利用木箱或板紙箱做成育雛箱。

保溫以用電池比較安全而方便。其他，也可以應用煤油或木炭來保溫，但要注意火災和煤氣中毒。保溫不要太高，如果太高，就容易生病以至死亡。我們可以從雛雞的生活情形看出保溫是不是適當。如果溫度太高，會使雛雞喘氣，同時因要避開熱氣，常常擠在一個角落裡。太冷時也會同樣堆在一個角落，或擠在燈罩下。如果保溫的溫度很適當，雞群就在育雛箱內均勻散佈，有些把頭頸伸長睡覺，箱底的雞糞也會散佈均勻。

雛雞在出生三天後，如果天氣良好，氣溫暖和，可放在乾燥的草地上運動，晒晒太阳。但要注意不要使胸腹接觸到



論醫；伊悔欺卜都人人，字識應為因福阿 (三) 是字識應，站一過站一車火 (二) 明寫乾未漆油，景光好正真園公 (一)

。二千寫千二明明，據寫收錢借 用無)工採無算賢福阿；慘正真 目，(用中不)用路無字半識(不)應；明

。站過坐經已到算，(處 •(明失)明育那像相(好睛眼)金

保持家畜的健康

王偉英



我們無論飼養那一種家畜，總是希望牠們不生病、長得快，可以早些送到市場上，賺回成本和利潤，或是繼續大量地繁殖下去。但是，家畜的健康和成長的快慢，絕不能單靠飼料成分的好壞來決定，而科學化的管理，才是畜牧事業成敗的主要關鍵。

一、定期的巡視

無論飼養那一種家畜，每天早晚，都應該詳細觀察牠們的健康狀況。如果發現有和平常不同的狀態時，應該立刻把牠挑出，單獨飼養，並請獸醫詳細診療，以防傳染病的蔓延。許多畜牧事業的失敗，都是由於一時疏忽而造成的，所以一切絕不可馬虎了事。家畜是否有病，如下判斷：

(1) 採食狀況：健康的家畜，一定採食旺盛，吃得津津有味。如果懶於採食，或停止採食時，一定是生病了。

(2) 起居動作：健康的家畜，行動活潑，步行敏捷，對外來音響和環境變化的反應靈敏。如果有病，就動作遲緩，反應遲鈍，步行蹣跚，或單獨離開畜羣，或伏臥呻吟。

(3) 皮膚、被毛，及露出粘膜的外觀：健康家畜的皮膚柔軟、彈力強，被毛美麗有光澤，露出粘膜（如眼結膜、口腔粘膜等）呈薔薇色。牛、豬等家畜，平時鼻端濕潤。病畜的皮膚僵硬、粗糙，被毛粗剛、逆立、沒有光澤，露出粘膜多呈暗赤或灰白色。牛、豬

等家畜的鼻端變為乾燥。

(4) 排泄：如果一天或半天，不見家畜排出糞尿，就算是病態。又，一般正常家畜糞便的硬度、色澤，和排尿量的多少和色澤都有一定，如果發現有異常，就是病態。

(5) 呼吸次數和體溫：健康家畜的呼吸次數和體溫，都有一定。過多過少都是病態。測定呼吸次數，可看動物腹部的起伏，或把手背伸在動物鼻孔前，以查覺呼出的空氣等方法來計算。各種家畜每分鐘的正常呼吸次數，馬為八—十次，豬為十—十五次，牛為十二—十五次，羊為十二—二十次，雞為四十—五十次。體溫的測量，以用體溫表插入肛門內的方式最為方便。一般家畜的正常體溫平均數，馬為攝氏三十八度，牛為三十八.五度，豬三十九度，羊三十九.五度，雞為四十二度。

二、衛生和管理

(1) 飼料的衛生：飼料應該儘量用新鮮、清潔的。腐敗、不清潔，或混有其他有害雜物的，應該馬上清除、更換，絕不可勉強使用。家畜的飼料和人類的食物一樣，無論粗



認人二子父，發好是在實字識 (九)
收年竟看愛，吧呵都尾頭邊厝；學廣
• 好成



識有設，辦創新村農近最 (八)
認，班入加心洪福阿；班習補字
！慢無是學愛廣



田日日，(民農)人田做爸老福阿 (七)
正廣(草拔)草塊肥落；工做(在)塊中
• (忙幫)共相到叫常時，忙