

潮濕的草葉而受涼。並且要注意狗、貓等動物的加害。

出生後六星期，如果氣候變冷或陰雨，還是要放進育雛箱中，以避免因受冷而生病死亡。

二、雞的飼料

雞，在出生後的頭一個星期，最好飼給粒餌。粉餌就較不適宜。出生三天以後，可在箱頂掛一把很嫩的青菜，供給小雛啄食。第二週到第八週，可以改餵粉料，可按照下表配合：

玉蜀黍三十三%，米糠六
·七%，麩皮十%，豆餅二十
三%，花生餅十二%，魚粉八
%，骨粉三%，貝殼三%，食
鹽一%，魚肝油〇·三%。

魚粉中如果含有鹽分，上表中一%的食鹽可以不要供給。這些飼料以外，要另給青菜，以容量計算，每二份的粉料和一份的青料混合餵給。此外如能加些抗生素（約〇.二%）在飼料內，也是很有益的。

除乾飼料外，也可餵給濕料。把上述的混合飼料，和一些水攪拌，就成為濕料。飼料每天分四次給食。每次的飼料量，以雞群在半小時內能吃光為最適當，如果太多，便會堆積腐敗，雞吃了會不好。

市上有小魚或什魚類——這種小魚或什魚類煮熟給飼。如魚內臟、魚脣骨肉等出售。但是如果用腐敗的魚，就會使在雞出生後四星期時，可以把雞中毒而死亡。

青蒜 蒜球 蒜苔

陳文郁

蒜喜歡輕鬆而肥沃的砂質壤土。在酸性土壤或排水不良的粘質地生育不佳。普通食用蒜的地下部份，叫做蒜球。蒜球可以用來繁殖。採食幼嫩的蒜葉，叫做青蒜。現在本省栽培的主要品種有埔蒜、黑葉蒜、花蒜等三種，品種特性如下表：

花 蒜 兼 用 大 平 滑 稍 粗 稍 強	黑 葉 兼 用 大 不 平 滑 粗 中	埔 蒜 球 用 小 稍 平 滑 細 強	品 種 栽 培 用 途 球 形 球 面 莖 葉 辣 味	產 量 青 蒜 蒜 球 蒜 苔	公 斤 數 一 分 地
---	--	--	--	--------------------------------------	----------------------------

種球繁殖的
適期在八月
至九月（青
蒜用）及十
一月（種球
用）。栽植

作高畦，畦幅約一二〇公分，用腐熟堆肥當基肥，一分地約施用二，〇〇〇公斤。整地時先把堆肥耕入土中，然後打鬆土壤，耙平畦面。整地後，以行距株距各十公分的植距，密植蒜球。普通一分地約需種蒜五〇〇公斤左右。蒜球種植後，覆土厚約三公分，再覆草。以後在土壤乾燥的地方，應隨時灌水。播種到發芽，約需十五天左右。除草應該按時施行。追肥可用人糞尿，一分地約用二，〇〇〇公斤，分四次施用：第一次在幼苗約三寸高時施行，以後每十五日施行一次。生育期中，應該注意灌水和排水，並防除薊蔥馬為害。青蒜的採收期，約在十二月到一月。蒜球的採收期，約在三月到四月。採收後的蒜球，可放在屋內通風優良的地方涼乾貯藏。

蒜苔就是蒜的花穗。本省只有花蒜一種能產蒜苔，其他品種都不能抽穗。蒜苔的栽培方法，和普通蒜相同。在抽苔後，


還沒開花時採刈。採苔後的蒜株，仍然可以留作蒜球採收。



山雨大日連，市城去車踏福阿（四）
 跋，示告看（懂不）騎賣爲因；裂崩
 ！死（點一差）險險坑深（下跌）落



伊勸生醫，院入來傷受禍阿（五）
最人做，時年少想回中院；書讀着
！字識嘛按



聞無是但，好字識（道知）影知福阿（六）
，顧人無弟小爲因；學去（以可）通（暇無）
！塗糊伊福阿是不