

保持家畜的健康

王偉英



我們無論飼養那一種家畜，總是希望牠們不生病、長得快，可以早些送到市場上，賺回成本和利潤，或是繼續大量地繁殖下去。但是，家畜的健康和成長的快慢，絕不能單靠飼料成分的好壞來決定，而科學化的管理，才是畜牧事業成敗的主要關鍵。

一、定期的巡視

無論飼養那一種家畜，每天早晚，都應該詳細觀察牠們的健康狀況。如果發現有和平常不同的狀態時，應該立刻把牠挑出，單獨飼養，並請獸醫詳細診療，以防傳染病的蔓延。許多畜牧事業的失敗，都是由於一時疏忽而造成的，所以一切絕不可馬虎了事。家畜是否有病，如下判斷：

- (1) 採食狀況：健康的家畜，一定採食旺盛，吃得津津有味。如果懶於採食，或停止採食時，一定是生病了。
- (2) 起居動作：健康的家畜，行動活潑，步行敏捷，對外來音響和環境變化的反應靈敏。如果有病，就動作遲緩，反應遲鈍，步行蹣跚，或單獨離開畜羣，或伏臥呻吟。
- (3) 皮膚、被毛，及露出粘膜的外觀：健康家畜的皮膚柔軟、彈力強，被毛美麗有光澤，露出粘膜（如眼結膜、口腔粘膜等）呈粉紅色。牛、豬等家畜，平時鼻端濕潤。病畜的皮膚僵硬、粗糙，被毛粗剛、逆立、沒有光澤，露出粘膜多呈暗赤或灰白色。牛、豬

等家畜的鼻端變為乾燥。

- (4) 排泄：如果一天或半天，不見家畜排出糞尿，就算是病態。又，一般正常家畜糞便的硬度、色澤，和排尿量的多少和色澤都有一定，如果發現有異常，就是病態。
- (5) 呼吸次數和體溫：健康家畜的呼吸次數和體溫，都有一定。過多過少都是病態。測定呼吸次數，可看動物腹部的起伏，或把手背伸在動物鼻孔前，以查覺呼出的空氣等方法來計算。各種家畜每分鐘的正常呼吸次數，馬為八—十次，豬為十—十五次，牛為十二—十五次，羊為十二—二十次，雞為四十—五十次。體溫的測量，以用體溫表插入肛門內的方式最為方便。一般家畜的正常體溫平均數，馬為攝氏三十八度，牛為三十八.五度，豬三十九度，羊三十九.五度，雞為四十二度。

二、衛生和管理

- (1) 飼料的衛生：飼料應該儘量用新鮮、清潔的。腐敗、不清潔，或混有其他有害雜物的，應該馬上清除、更換，絕不可勉強使用。家畜的飼料和人類的食物一樣，無論粗



認人二子父，發好是在實字識 (九)
收年竟看愛，吧呵都尾頭邊厝；學真
• 好成



識有設，辦創新村農近最 (八)
認，班入加心洪福阿；班習補字
！慢無是學愛實



田日日，(民農)人田做爸老福阿 (七)
正真(草拔)草塊肥落；工做(在)塊中
• (忙幫)共相到叫常時，忙

