




防治柑橘星天牛

可用地特靈乳劑

問：豐年五卷十六期八頁載有「應用新藥地特靈防治木麻黃星天牛」，請問是否同樣可以用地特靈乳劑來防治柑橘的星天牛？這種新藥何處可以買到？（臺北縣慶清源）（豐原鎮東華果實園）

答：蛀害木麻黃防風林的也就是蛀害柑橘樹幹的同種星天牛。所以塗刷地特靈乳劑防治木麻黃星天牛的方法也可以同樣用於柑橘。塗刷時須稀釋三十五倍，就不會有藥害發生，可以安心施用。地特靈可向臺北市長安西路二八九號建源有限公司購買。（省農藝試驗所陳履通）



限公司購買。（省農藝試驗所陳履通）

天牛藥「柑肺針」

對柑樹有毒害！

問：爲了防治柑橘星天牛害蟲，我會使用過所謂「天牛特效藥柑肺針藥水」（臺灣農藥研究所製，連絡處臺北市太原路七十四號）。結果損害嚴重，用藥水注入蟲穴內後約一個月，樹皮和木質全都枯了。（廖清源）

答：你所說的「柑肺針特效藥水」

「我們沒有見到過，想來一定是騙錢的商人所幹的事。希望農友們大家都注意不再受騙。」（陳履通）

注意預防柑橘葉燒病

問：柑橘果實經過太陽照射後使果皮變黃，後來漸漸變成紅棕色，中央現出褐色的網陷狀（附上病樣）。請問這是什麼病？怎樣會發生的？怎樣治療？（彰化縣花壇鄉李棟明）

答：這是柑橘日燒病。在氣候忽晴忽雨的時節，最容易發生，因爲在大雨後放晴，假如果皮表面積水較多，雖然經過日光照射後仍然不能在短時間內蒸散，於是有一部份雨水慢慢滲入果皮內，使表皮組織破壞，成爲這種病症。一般生長在枝葉繁茂遮蔭間的果實，因爲積水無法迅速蒸散，也同樣會引起這種病症。這病發生後，如果沒有其他病菌乘虛而入，不過果皮色澤不佳有傷痕，對於食用並無影響，但商品價格必然減低。柑橘發生日燒病後，很容易有其他病菌浸入，就會發生嚴重的後果。爲避免日燒病的發生，果園內應力求通風，使雨水便於蒸散。（省農藝試驗所梁崇仁）



果樹苗木定植

切忌入土過深

問：柑橘定植過深，接穗埋入土中部份也發生了新根。請問這樣對於柑樹有什麼影響？（苗栗鎮謝水生）

答：柑橘定植過深，使接穗部生根會有很大的害處。第一是失去了砧木的作用，砧木既然不能生長，會使

果樹不開花不結果而且容易枯死。所以苗木定植時接合部份必須在地面之上。不僅是柑橘，其他任何果樹，都是如此。（臺灣大學園藝系胡昌熾）

平地種植柑橘

注意地下水高度

問：平地種植柑橘地下水的高度在地面下幾公尺爲宜？（謝水生）

答：柑橘根生長深度雖依砧木種類而不同，但一般都在一公尺以上，所以地下水的高度以地面下一公尺半爲宜。（胡昌熾）

柑橘苗木移植後

何以多年不結果？

問：我從員林買來的柑橘苗種在臺中西屯，經多年不結果，這是什麼原因？（臺中市張文生）

答：柑橘苗木移植後不結果的原因很多，有下列各點：①栽植太深，根生長不良；②栽植時，施用沒有充分腐熟的堆肥，使根部受到損害；③土地排水不良，根不能生長；④移植時期太遲，在三四月根正在生長時受到損傷；⑤苗木的癒合部有腐爛病，阻礙苗木的生長；⑥有蟲害，如潛葉蛾、蚜蟲、鳳蝶、天牛、介殼蟲等都能阻礙苗木的生長。（胡昌熾）

讀者服務

- △出售一年生高橋桶柑苗五千株，晚而夏橙苗五百株。臺北縣新店鎮百忍里十四路九鄰十一號林火土。
 - △出售一年生種柑、桶柑、海欖苗，及一、二年生正酸桶苗，共數萬株。新竹縣新埔鎮四座里七十七號永茂柑橘種苗園林兆成。
 - △仔鬼出售。彰化縣竹塘鄉長安村東陽路二十二號詹金聰。
 - △徵候脚種高果（蜀黍）種子。詹金聰（住址見前條）。
- 按：本服務欄限本刊長期訂戶，欲發表者請註明訂戶號碼：

農村的福音

經濟部中央標準局臺專字第 二〇〇號特准專利十五年的最理想粟穀碾白機「現已出品了」



「見面」

人力用

（脚踏型）牌白機

（圓面）牌白機

種類：（一）脚踏型二人踏

（二）脚踏型一人踏

使用方法：每次用谷十五至廿斤，一分鐘約三百轉，僅需二十分鐘即可碾成白米，若要脚踏更輕，則一次投入谷十五斤，脚踏十分鐘後，全部取出，次再投入谷十五斤，同樣亦需十分鐘，即將第一次碾谷加入三十五斤

再踏十分鐘後，即成白米。

且可裝裝置碾穀兩用。

動力用 自動型

牌 淺 重

粟穀碾白機

「圓面」

種類：（一）投入谷十五至廿斤，馬力（單相馬達）

（二）投入谷三十至五十斤，一馬力

（三）投入谷五十至五十斤，二馬力

使用方法：照如右種類數投入穀粒。每分鐘均需約二百五十轉左右。經過二十分鐘即碾成白米。



如蒙賜顧 無任歡迎！

器具製造 批發零售 重茂行

臺中市區民權路四十六號

電話：一九一八號（轉）