

時，應檢查巢內種蛋有沒有破碎。破碎的種蛋，應該馬上取出。如果種蛋被破碎蛋污染，應該把它拿出，用溫水洗淨，拭乾後再放進去。

(8) 如母雞不願繼續孵化，便要另找一隻雞抱雞來接抱，或把這些蛋放到鄰近的孵化器或孵巢中。

(9) 如果天氣很乾燥，每天要用冷水洒在孵巢周圍的地面上，並在箱旁放置一盤清水。

(10) 到第二一二二天時，應禁止母雞離巢。這個時期就需餵食。正常健康的小雞，都會在第二十一天內出殼，以後才出殼的小雞，身體大多很衰弱。

(11) 剛孵出的小雞，不需給任何飼料。二十四小時後，開始餵給細碎的粒飼料，並供給溫水飲用。二天後可給雞粉料。二星期後，開始餵給較嫩的青菜。(完)

茭白筍

陳·文·郁

茭白筍(脚白筍，マコモ)有青殼種、白殼種和紅殼種三個品種。白殼種的品質最好，收量也較多。但是早熟栽培時，青殼種較適宜，晚熟栽培，以紅殼種較為理想。

茭白筍適於有機質豐富的粘壤土、水田，或肥沃的池畔、河岸栽培。栽植適期，北部在二月下旬到三月中旬，中南部在二月中旬到三月上旬。過早栽植時，因低溫的關係，苗期生育不佳。晚植的，也因氣候的關係，生育期間縮短、分蘖不旺、收量不多。茭白筍栽植地的整地法，和水稻相同，基肥以用厩肥較理想。整地後，從舊株採取高約四十五公分的新芽栽植。適宜的栽植株距是行間一〇〇公分，株間七五公分。一分地可栽一、四〇〇株左右，每一株栽植一支苗。栽植不可過深，只要不倒伏就可以。栽植茭白筍後，田間應時常保持深度約一五公分左右的水量。中耕除草的方法和水稻相同，應按時施行。追肥必須在植株還沒充分繁茂時施完，通常都使用人糞尿，一分地約一、八〇〇公斤，分三次施用。施追肥的方法和和水稻相同。肥沃地不須追肥。生育期中，如有枯葉，應隨時除去，以防病蟲的繁殖。

青殼種的茭白筍約在九月上旬採收，但是母株(一株只有一支)可在六月間採收。白殼種大約在十月上旬，紅殼種大約在十月中旬採收。採收適期為莖穗的苞片稍為裂開、微有嫩莖時最理想。過遲採收，就品質粗老、莖肉變黑，不能供食。採收時，用小刀由莖穗的下面刈取。採收後的嫩莖，如果連苞片一齊浸在水中，可以保持三日新鮮。採收期間約四十日。

茭白筍的品種特性表

品 種	葉 色	熟 期	嫩莖大小 (一分地產量)	品 質
青 殼 種	青	早	約七五〇	中
白 殼 種	黃青	稍晚	約八三〇	佳
紅 殼 種	青微紅	晚	約八五〇	中

採收完畢後，如果要繼續栽培，便應馬上清理莖葉，使次年的生育良好，但每三年應新植一次。

(上接第十二頁「我經營稻作的方法」)工捕殺螟蛾卵。螟卵散在葉尖部，稻株較小時，較易看見，人工捕殺最有效，請農友們自己來試試看吧。月夜把田水儘量排出，以免螟蛾

沿水的光線集中到本田中。二十日以後，用富粒多藥劑噴射。去年噴射了二次，病蟲害減少，稻谷增收百分之五以上。(本文已經嘉義農業試驗所王茂康先生核閱更正)



心母養，愚兒真性情父養(四)哭准不打殺治拍，妻正真懷。樂娛是做當罵打，

青八二，嫩縹真做生治拍(四)姑間花賣轉伊將，時年少春記。做，(女婦某查做幸不生入(西)顧人無痛病苦生，補(已自)