注意病疾的牛仔

•何起龍•

仔牛對疾病的抵抗力很弱，所以要隨時注意飼養管理，遇着疾病，能够很早的發見，加以徹底的治療，可以減少經濟的損失。主要的仔牛疾病如下：

（一）初生仔牛的假死

原因：由於母牛運動過度、患有心臟病、鼓脹症，胎兒過大、體勢異常、分娩遲延、臍帶早期斷裂等。

症狀：初生仔牛的口內、鼻孔中積蓄粘液，各粘膜呈蒼白色，並呈假死狀態。

治療：除去口中及鼻腔內的粘液，在皮膚輕加按摩：以促進呼吸，並行人工呼吸。人工呼吸法：把仔牛翻倒上仰，使頭部稍低，尻部略高。一人把前肢分別拿住，另一人把手指放在胸壁上，當前肢交叉時，壓迫胸部，前肢張開時，放鬆胸部，如此繼續多次。

（二）胎便停滯

原因：初乳不足或異常，是直接的原因。初生仔牛的虛弱或體質異常，爲間接的原因。

症狀：仔牛出生後一—二天，不排出胎便。常見背部彎曲、苦悶、疝痛，在肛門前有硬結的胎便。

治療：用微溫的食鹽水灌腸，或用五〇公分蓖麻油混入牛乳給予，人工排除肛門附近的糞塊。

（三）下痢

原因：人工哺乳失宜爲直接原因。其他如受寒冷，牛舍潮濕不潔等也有關係。

症狀：初期沒有什麼顯著變化。以後食慾逐漸減退、發熱。糞柔軟，起初呈黑色，後爲灰白色，有惡臭，混有泡沫或血液。

治療：注意厩舍清潔，放入柔軟的敷藥，並防止風的直接吹入。內服阿片酊五·〇，大黃酊一〇·〇，一日二回分服，或以鞣酸蛋白五·〇，柳酸二·〇，一日二回分服。（參看本刊三卷十一期第十二頁「小牛下痢簡單的治療法」）

（四）仔牛臍炎

原因：因仔牛臍帶污穢而起。

症狀：臍部潮濕、紅腫。臍端濕潤、惡臭、排出分泌物。背部彎曲、不飲乳、發熱、脈搏細弱，常會誘發膿毒敗血症、或臍帶靜脈炎。如果形成瘻管，就會經常排出膿汁。

治療：初期用雙氧水洗滌，塗布紅汞液，或撒布碘仿等。全身症狀時注射盤尼西林。

（五）虱寄生

症狀：仔牛的耳、頸、背、腰等被虱寄生發癢，因而將身體在牛舍的牆上摩擦，致使牛毛脫落、分泌滲出液、皮膚增厚、營養不良等。

治療：給予營養豐富的食物。保持牛舍清潔。把長毛刈除。撒布除蟲菊粉，並用三%煤溜油醇液塗布。

附註：應用藥劑或注射治療牛的疾病時，要有獸醫的指導，才不致發生意外的危險。



(七)治拍病着賣(不能)趁(賺)錢，伊求會女婦
(得幸)再加；去出走病醫做假
離脫來坑火此從，

(八)治拍工做(在)塊厰工
着門，工做(在)塊厰工
相是志意入二；入年青個一
(夫)厄嫁就治拍久不，(同相)共

(九)甘唖，孩女全生所然雖
伊苦痛女養；宮入受去賣(願
、來過做伊是為因；知都