



群鴨平北的潑活康健

不要給溫，可以放在墊草的地面上飼育了。室內應裝有二〇瓦(W)的電燈，在夜間有微光，可以避免雞鴨互相堆擠的弊害。

三、飼料和飼養

雞鴨移入育雛箱羽毛乾後，即可給與混合飼料和清潔飲水。粉餌混合的比例，和雞的飼料配合相同，例如：玉蜀黍三三%，麥一〇%，米糠六·七%，大豆餅或花生餅二五%，魚粉八%，骨粉三%，貝壳粉三%，食鹽一%，魚肝油〇·三%。開頭兩日至一星期，可把粉餌與水混濕，使飼料呈有黏着性即可，然後撤佈在飼料盤上給與。飼料盤可用木板或鋅片製造，底部約為一尺半見方，四邊釘三、四分高的木條為邊緣，以防飼料散出。

飲水器應放在飼料盤或飼料槽的旁邊，因為鴨的習性，是吃一口飼料，就要去喝幾口水或洗洗喙和鼻孔的。飲水器要置鐵絲網架上，以免弄濕墊草。

此外還要特別注意，應用自動飲水器，不要給鴨腳深入飲水器內把週身弄濕了。二個月後的雛鴨，可改用中雛的飼料，配合比例例如玉蜀黍四〇·七%，麥一〇%，米糠一〇%，大豆餅或花生餅二五%，魚粉七%，骨粉三%，貝壳粉三%，食鹽一%，魚肝油〇·三%。中雛飼養到將要產卵時，就要漸漸改為產卵鴨的飼料，配合比例例如玉蜀黍四八%，麥一〇%，米糠一〇%，大豆餅或花生餅二二%，魚粉四%，骨粉三%，貝壳粉三%，食鹽一%。

幼雛時飼料給與次數，定時每日四次，二、三星期後改為三次，生蛋後的鴨，每日上、下午各給一次就可以。青飼料如青菜殘葉等，切碎混入飼料中飼給。約為每天飼料量的三分之一。如用煮熟的菜葉，只要飼料量的五分之一。鴨的運動場內，要经常放置粗砂粒或小碎石，便利鴨羣自由啄食。

四、幼雛的管理

幼雛鴨不使它週身潮濕，因為幼雛的成羽未生出前，初生的羽毛弄濕後不容易乾，尤其是在陰雨的氣候，很容易受寒，輕微的生長不良，嚴重時就會夭亡。很多人以為鴨是不怕水的，但是幼雛成羽未出前，最怕潮濕，要特別注意。雛鴨時至少三星期以後，才可以下水，但最安全還是滿六個星期，等鴨的「背羽」出齊後不怕水濕時才讓牠們到池塘或溪溝去游泳。鴨場附近，如果沒有池塘溪溝，可以在鴨的運動場挖築一水泥溝，寬一尺深五寸，溝底略傾斜，一端經常可放入自來水，至另一端可以排水。這種溝可供鴨飲水和沐浴，每日要換水一次。鴨場的土質，以砂地或小卵石為佳。鴨舍的建築的高度，以工作方便為標準，材料以就地取材為原

則。鴨房能禦風雨即可，不必太考究的。

鴨餵與濕飼料時，要特別注意新鮮，每次調配給與剛好吃完為宜。濕飼料存置久了之後，容易發酸，發酸的飼料，雛鴨吃了常致抽筋而死，這點要特別注意。

北平鴨的腳脛的關節特別脆弱，很容易被弄傷而成跛腳或不能站立。所以捉鴨時應抓頸項部份，千萬不要捉腳脛部份。室內飼育時，要有充分的運動場所，每鴨要有四平方尺的面積。在太擁擠的環境裏，會引起軟腳的毛病。舍內墊草要經常添加，保持乾燥，每隔十日更換一次。

北平鴨幼雛時期，生長速度很快，八、九星期的體重，平均達二·五公斤，已可屠宰食用或出售。生長較慢的，到十二星期，也可以屠宰上市場了，在這時期屠宰或出售，為最經濟，平均約吃三·八公斤飼料，體重增加一公斤。十二星期以後，生長速度慢，飼料吃得

多，消耗飼料最不經濟。(未完，下期續。)



張鴨平北化解工人