


瓜西子瓜的厚優益利



(面切的瓜西子瓜)

· 郁宗雄 ·
· 陳 嘆 ·

本省光復時，因原種來源中斷，栽培絕少。但本省「瓜子」消費量很大，近年有少量栽培的，利益很優厚，現在根據筆者試栽經驗，介紹栽培要項如下：

(一) 「粗花」和「大瓣」

臺灣現今流傳較廣的品種，依筆者鑑定，似為「粗花」。「粗花」品種生育強盛，莖蔓繁茂，分株多，葉片較普通西瓜細裂而缺刻很深，結果力很強，果實不大，重約二公斤一個。果形近於球形，平滑無溝肋，皮色淡綠，散佈暗綠色縱走網紋十多條。瓢肉白色綿軟，淡而無味，但種子數多且形大。「瓜子」邊緣黑褐色，中央褐色。除上述「粗花」品種外，近年還有「大瓣」品種，「大瓣」品種的瓜子特別潤大，但每個果實所含種子數不及「粗花」多。

(二) 土地利用最經濟

瓜子
西瓜(瓜
子瓜，打
瓜)在臺
灣早在百
餘年前已
有栽培，
但因栽培
不得法，
採種不合
理，品種
雜交退化
，經營不
合算，因
此未被人
所重視。


一般不適於普通作物栽培的砂地、砂丘地、溪床、海岸地帶以及新開墾地，只要有水源灌溉，都是栽種瓜子西瓜的理想適地，所以在土地利用上是很經濟的作物。此外，排水良好的砂質土或砂質壤土，也適於瓜子西瓜的栽種。排水不良的粘質壤土，遇雨易使根部腐爛，上年種過瓜類的土地，也不可再用。

(三) 播種的適期

北部砂丘地二月上旬至五月，中部沿海地區十二月及一月至四月，南部溪床地八月下旬至十二月及一月，砂地八月至十二月及一月至四月。如在陰濕季節栽培，易生病害。強風或暴風季節栽培，也容易失敗。

(四) 施肥的一例

瓜子西瓜栽種目的，在於種子，所以不必考慮肥料種類對瓜肉品質的影響。因此施肥儘可能選擇便宜、易得、施用方便的種類施用。磷肥須要稍多，以促進種子的成熟和充實。施肥法，可仿照當地普通西瓜的施肥法。茲舉十公畝(一分地)施肥量一例如下表，以供參考：



瓜子西瓜的種子，原形大，和黃瓜小，比大，較普通種子①；較粗花②，和瓣大③。

肥料種類	總用 基肥 追肥 用 量			
	第一次	第二次	第三次	第四次
堆肥	三〇〇	三〇〇	三〇〇	三〇〇
硫酸銨	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇
過磷酸鈣	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇
草木灰	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇
硫酸鉀	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇

以上肥料基肥中，硫酸銨，可用氯化鈣或糞水代替。上表只是一例，實際施肥量須依照土地肥瘠，酌量增減。



逐邪驅，重日日病(的)个仔团 ①，開通(不)嘸(們他)恩顯九阿 ②
 內起開蓋窰；(法辦是不)工彩無鬼) 某戀(夫)庭戀；鬼罪得靈無了開
 。人死害在實九阿，空空 虧克眞騙被金黃，(話)嘴伊聽(妻
 卜心存九阿，假是本鬼逐金黃 ⑦
 着(請眼)周目人叫；提偷(要)
 。袋仔衫在藏去提，(眼合)客愛