


瓜西子瓜的厚優益利



(面切的瓜西毛瓜)

病蟲害
防除

爲害很大。防除法：①種子催芽後才播種，②播下後覆土植穴內，再撒穀糠一層，使鼠類無處可獲得充實的種子，瓜子仁肥大。瓜子瓜開花後，約經三〇日左右，果實成熟。成熟的果實用手指彈擊時發出沉濁聲，未熟果則發清脆聲。全田果實收穫期間約二十天，可分幾次採收，才可以等全田莖葉完全枯萎後一次採下。從播種到收完一作，約須八十五日（高溫期）至殺老鼠（以上病蟲害防除也適用於普通西瓜）。

(八) 一分地三千元

要作原種用的採種時，必須參照本刊第四卷第九期所載「西瓜的採種法」，否則所採得的種子極易變劣，不可再為種用。種果宜選種子大而多的採種。

附註：瓜子加工行有：①臺中縣豐原鎮下街里正路二三六號蔡德慶；②彰化市太平里永樂街五〇號劉景盛。原種商有雲林縣臺西鄉臺灣西村東陽照像館轉丁從。

瓜子瓜和普通西瓜，很容易雜交互相變劣，所以在採留原種時，必須要行人工自花授粉，或者選擇沒有種西瓜的地方，實行隔離採種。或者限定某一地區，只種一個品種採種，這樣才可以保持品種的特性，不會變劣。只要憶

(九) 採種的注意點

一百日（低溫期）。果實採收後不必運回家中，就在田間採洗種子，洗種時把西瓜橫切為二，用手指挖出瓢肉（果皮尚可飼養禽畜或加工利用），盛入篩內，擠出瓢肉內的種子。這時種子上大多附有薄膜的氣泡，使種子和瓢肉同樣浮在水面不易分離。所以要先用篩濾去水分，揉壓種子除去氣泡，種子就下沉。加水漂去果肉碎屑和懸浮在水面的空種子後，篩底只剩下清潔的優良種子，放在竹蓆或晒場上翻晒一、二天就可收藏出售。栽培得法時，大概十公畝地可收一二〇〇至一五〇〇果，每果平均種子收量約七十公分，共可收種子八十一至一百公斤。每公斤批發價約三〇元，收入約二四〇〇元至三〇〇〇元，但全部成本不到八百元。



⑦ 有，（群大）堆大陸人害蟲眠。⑧ 愛蟲無內腹；虧克真簪（不）嘔蟲食。⑨ 肥會就然自食愛，飯食。