



森林

琉球松濕地松怎樣造林

問：美國南部松和琉球松樹的經濟價值怎樣？育苗和造林上要注意那些事項？

答：經濟價值：濕地松可供採脂、造紙、建築用。琉球松材可供建築、土木、採脂、造紙用；琉球松可以防風，防潮和土砂升止。

育苗及造林：濕地松在十月採種，二月播種，株距五公分，行距三十公分。次年春造林，株行距為一公尺半至二公尺。琉球松在十一月採種，播種量（撒播）〇、〇〇六公升，造林須有遮蔭，每公頃植二千五百株。

採種接洽處：濕地松在南投魚池臺中山林管理所水裡坑分所。琉球松在臺北山林管理所。（省林業試驗所甘偉松）

更正啓事

本刊六卷三期七頁「洋蔥黑斑病可噴谷仁樂生」新聞中「噴撒五十倍液」係誤排，應更正為「五百倍液」。又六卷三期二十九頁「板栗在何處可種？」第六行「海拔二千公尺」係錯誤，應更正為「二百公尺」。請讀者注意！

怎樣播種和移植苦梗？

問：①苦梗樹怎樣播種可以發芽迅速而整齊？

答：①苦梗的播種適期是春季或雨季。在播種前把種子浸水三、四天，發芽可以較快。如果碰到天旱，就須酌量灌水，也可使種子發芽迅速而整齊。

②苦梗樹的幼苗在什麼時候移植最適當？（南投縣中寮鄉陳宗津）

答：①苦梗的播種適期是春季或雨季。在播種前把種子浸水三、四天，發芽可以較快。如果碰到天旱，就須酌量灌水，也可使種子發芽迅速而整齊。

②移植幼苗，應在苗木生長停止時舉行。所以移植時間以初春最適宜，或者在秋季苗木生長將停止時也可。（甘偉松）

樹果

怎樣管理可可椰子？

問：可可椰子的簡單栽培管理方法怎樣？（屏東市黃明哲）

答：可可椰子的栽培管理方法簡述如下：①勿在樹間中行耕，即使淺中耕也會損傷可可椰子的根群。②須多施肥料氮、磷、鉀三要素不可缺，尤其以鉀肥最必要。③乾燥時最好能灌溉。④通常在七八年後結實，但若放任不施管理，十五年以後才開始結少量果實。（嘉義農業試驗分所蔡致談）

病蟲害

防治柑橘類的多種害蟲

問：為防治柑橘害蟲，用夏油乳劑、魚藤精乳劑、和硫酸菸精（ニコチン）或菸葉浸出液三者相混合，拿這混合液來噴撒，是否有很好的效果？（苗栗鎮謝水生）

答：夏油可以和魚藤精乳劑，硫酸菸精（尼古丁）或菸葉浸出液混合使用，這種混合液是可以防治柑橘上的各種介殼蟲、蚜蟲、木蝨、粉蝨和橘潛蛾等。但加入魚藤精乳劑後，雖然可以增加防治介殼蟲的效力，不過性能與硫酸菸精相同，似乎可以不必再加魚藤精乳劑混用，這樣可以比較經濟。因為硫酸菸精或菸葉浸出液更有防治橘潛蛾的功能，所以可用夏油乳劑和硫酸菸精（或菸葉浸出液）兩者混合噴用就足够了。（省農業試驗所陶家駒）

棉

山地是否可種棉花？

問：在山間的平地種棉花是否適當？這地方冬季給水不完全而排水良好，天晴時候較久土壤就變硬。假如可以種，什麼時候種最適宜？（臺東縣東河鄉李龍）

答：山間的平地倘如當地海拔是在一千公尺以下，氣溫不過低，日夜氣溫相差不是很大時，也可以種棉花。最理想的土壤是砂質壤土，或堆質壤土。容易變硬的土壤不甚適宜，因為播種後容易發生缺株，生長不良。在臺東一帶，播種棉花的適期是三月下旬到四月，假如當地海拔高的話，就應該延遲在晚霜期以後才播種。（臺南棉麻試驗分所熊光斗）

增產的一方法 是用新農藥！！

- △洋蔥、蕃茄、菸草、馬鈴薯——葉枯病、立枯病、腐敗病、露菌病等一切病害特效藥
- △裕米農藥 乳劑、錠劑
- △稻熱病、苗病特效藥
- △最新超強力殺蟲劑
- △裕米農藥 乳劑、粉劑（富拉多相馬力）
- △EPN水和劑、PM乳劑
- △有機磷安全新藥、滅蟲聖藥
- △馬拉松乳劑
- △驚異的最強力殺鼠藥
- △鼠拉倒爾（野鼠用）
- △防鳥、捕鳥一舉兩得の力スミ網
- △春季各種優良蔬菜種子均備
- ☆請顧客注意
- 查左項農藥品據聞在市面發現有稀薄品或偽造品，請各位特別注意以免被騙。
- 三共株式會社農藥部 臺灣總代理店
- 北興化學工業株式會社 臺灣總代理店
- 臺灣農產企業公司
- 臺北市迪化街一段

讀者服務

△徵求純正華盛頓蘋果和羅錦岡甜橙苗木，以及果樹園圃用的刺仔種子。臺北縣沙止鎮白雲里一百一十一號關山會。

△徵求香（中藥用）種子。高雄縣鳳山鎮三民路兩里六十三號郭任榮。

△徵求純美濃種及桃園種小母豬各數頭。臺中縣清水鎮文昌街八十號周春富。

△徵求「偷脫」種鴿子。雲林縣北港鎮光復里橋廠宅八十號劉石鎮。

按：本服務欄限本刊長期訂戶，欲發表來信請註明訂戶號碼。