

美日 水稻增收特效藥

土蘭師扶朗多旺



—促進發根，健康幼苗—
—強化莖枝，增加分蘖—
—米粒豐滿，增加收量—
各戶一畝保證豐收

(請參閱農年第五卷第二十期第四頁)

風行全省，帶來豐收!!

各地運絡處	興農種子行	臺北縣三重鎮
	大信農藥行	臺中市力行南路八號
	美隆華瑞	臺中市第二市場內
	裕豐種子行	員林鎮中正路一九二號
	慶村種子行	和美鎮中正街12號
	金源農藥行	溪湖鎮光華里二溪路13號
		嘉義市彰南街392巷16號
		西螺鎮延平路77號
		斗南鎮第二市場內
		臺東鎮東華路二四八號
		花蓮市明義街七一號

△說明書函索即寄(請附郵票四角)

大豐農藥行

臺北市寧夏路23號·郵政劃撥第10620號

請用最新美國抗生素飼料



歐羅肥

必能得到意外的成功



經美國364次試驗證實，歐羅肥比其他抗生素飼料之效力高30%，能促進豬的生長35%，雞的生長22%，節省飼料10%。

一經使用，無不稱讚

- 一、陳技旺農友來信：「...比別家豬大，減少疾病，皮毛油黑，節省飼料...」(臺南新市和村)
- 二、日新農場胡場長說：「對促進豬仔生長，減少白痢的效果真是太大了！」(臺北中和鄉)
- 三、張振芳農友來信：「...經用二旬有餘，日見效力強...」(臺東豐原里)

總批發：新臺畜牧獸醫服務社

臺北市中山北路一段35號二樓 臺北郵箱410號

臺南分銷處 德生西藥房

臺南市民權路133號

(上接第九頁「臺灣的水稻栽培」)

，過深便妨礙殘株腐敗。插秧前七—一〇天，行第二次耕鋤，仍用刈耙破碎大土塊，用碌碡把稻株壓入土中。插秧前施基肥，再行耕耙一次。臺灣地處亞熱帶，土壤中有機質消耗快，水田施肥應以有機肥料為主，不足時，再以化學肥料補充，才能保全地力，穩定收量。若是連年單用化學肥料，土質便會變壞。茲舉稻田施肥實例(一公頃施肥量)如下：

甲：堆肥	乙：人糞尿
過磷酸石灰 二五〇公升(基肥)	過磷酸石灰 二六〇公升(基肥)
硫酸銨 四〇〇公升(一半基肥)	硫酸銨 三五〇公升(追肥)
氯化鉀 九〇公升(基肥)	氯化鉀 六〇公升(基肥)
或草木灰 三〇〇公升	

插秧前本田田面僅維持一層薄水，以便用正條密植器劃行，每縱橫交叉點插秧一叢，插秧完畢，淺灌田水，在三公分以內。第一期作插秧後五天左右發根，十天左右開始伸長；第二期作一晝夜發根，五天後開始伸長。伸長開始，表示秧苗已經活著，就可以開始輪流灌溉，以後每隔四—五天灌水一次，每次四至五公分深。過去有許多稻田，一方面灌水，他方面排水，稻田水流不息，用水浪費而且流失肥分，必須糾正。稻自孕穗至開花，需水最多，此期間水的補給不可缺少。當稻穗下垂時，即行排水，促進成熟。

水稻田中耕除草，應該在生育初期進行，一般農家情形，第一期作通常中耕三次，但最好能有四次。第二期作通常中耕兩次，但最好能有三次。第一期作應該在插秧後十五天開始第一次中耕，以後每隔九天行二、三、四次中耕；第二期作應該在插秧後十天開始中耕，以後每隔七—十天，行二、三次中耕。中耕除草前先行排水，追肥在一、三兩次中耕直前施用，然後將表土推揉翻轉，使土壤膨軟，肥分均勻，促進根毛發生，助長主株及有效分蘖發育。中耕用手撥或用車輪式手押

中耕器。收穫適期約在出穗後三〇—三五日。

(下期續談「今後稻作改進和前途的展望」)

後稻作改進和前途的展望」)

更正：前期本文第九頁優良水稻品種表中，臺北地區二期作「農育一八三〇號」誤為「農育木一八三〇號」。又二十三頁上欄，立秋節日期為「八月六日」，誤為「八月六日」，下欄栽種季節表中，花蓮區二期作插秧日期「七月上旬至八月上旬」誤為「七月上旬至八月中旬」請注意更正。