



芽吸的梨鳳留保樣怎

瑞 榮 黃



吸芽保留數多的，比較弱，抽穗百分數低，不能每株都抽穗結實。鳳梨栽植後的第一次收穫，須保留吸芽（後繼芽），供下年結實用。吸芽又叫抱芽、葉廣芽、串仔芽或雞腿芽。現在本省新植鳳梨，一般都使用裔芽，所以常常放任留存吸芽，根據在關廟、大寮、鳳山等地試驗的結果，吸芽保留數多的，比吸芽保留數少的，植株較弱，抽穗百分數低，不能每株都抽穗結實。吸芽保留數目多的，雖能增加果實產量，但果實較小，不適於製罐用，果實價值較低。所以，吸芽保留數目，最好不要超過二株。

鳳梨的吸芽，着生在母株葉腋間，根部不易伸入土中，如風大或田間操作時，容易折斷，所以應該選靠近地面的保留。



燒日和伏倒止防桿竹用使

鳳梨吸芽的發生期，因品種而不同。如早發生的正常開英種，都在三、四月，果實還沒收穫以前就發生，發生位置也較低，這種品種的吸芽選留工作，應在果實採收後（即八、九月）施行，採去發生位置較高的吸芽供栽植。如吸芽發生較遲的品種，多在果實採收後（冬季至春季）發生，這種品種，應在春季施肥前（三月），採除發生位置較高的吸芽。

鳳梨吸芽的根部，盤結母株，不易伸入土中，很容易倒伏枯萎，所以在平地栽培時，應在採苗後，用牛犁施行培土，使根部埋入土中發育，以防止倒伏。不能用牛犁的山坡地，應用三尺至四尺的竹桿，插在吸芽旁邊，用麻繩網縛，這樣一方面可防止倒伏，另一方面又可供果實防止日燒的支柱。

鳳梨在第二次結實時，被太陽曬壞的果實特別多，是因如上述吸芽容易倒伏的緣故。所以第二次結實時，防止日燒的工作非做不可，應在開完花後約一個月施行。吸芽葉部較短，用竹皮或繩仔都不好束縛，最好使用竹桿，插在植株旁邊，或使用田間雜草、稻草等，覆蓋在果實上面，以防止日燒病果。



改大度態此從，堅志意勸聽伯虎 ⑨ 因替是嘸，員導指輕輕紀年 ⑧ 通嚙導指聽着，絲半無訣秘講伊 ⑦
深張二第成變，田耕來導指從順；變 ⑤ 全完有驗經在實；傳宣來（們他 ⑥ 豐卜若，記要着法新好有；疑（可不）
。淵 ④ 撰自因影無是嚙 ③ 遲延無收