



「阿司卡利肯」服用圖解說明 (廣告)


アスカリケン

本公司代理日本東芝製藥株式會社出品之豬雞驅蟲良藥「阿司卡利肯」，已經有一年多餘，其效果之優良頗得農友們之推戴，每一個農村的角落都有「阿司卡利肯」之愛用者，實在感謝之至。蓋在日本之農村是已經最普遍的家畜常備藥也。本省之農村亦有同樣普遍，不過有一部份的農友不懂「阿司卡利肯」之用法及投藥量之疏忽致影響豬雞之健康實是遺憾也。


站在這一點敝公司為想要將「阿司卡利肯」之安全投藥法，用簡單圖解說明以能讓各位對該藥之瞭解並獲得正確之使用法後使每一個豬、雞、都來用「阿司卡利肯」驅除寄生蟲，然而可得豬雞之健康，對增產有所貢獻，這即是敝公司之唯一希望也。

用阿司卡利肯驅除
寄生蟲後之健康雞

沒有驅除寄生
蟲之不健康雞



蟲之不健康豬
沒有驅除寄生




寄生蟲後之健康豬
用阿司卡利肯驅除


阿司卡利肯之服藥指導

(一) 阿司卡利肯之秤量方法

(A) 阿司卡利肯盒內之匙拿出來



(B) 秤量須要正確



1匙
即是1公撮
即是1公分

正確
阿司卡利肯要平平(一公分)

不正確 (用量超過)
絕對不可以

(C) 豬雞有病或預防注射前一週及注射後三週以內或妊娠豬不可服用。

(D) 豬吃飽直後投藥不適當。要給飼料時同時給藥最適當。投藥的時候飼料減少一點兒(比普通之給與量減少)預防飼料中的藥吃不完留下。

(二) 雞之投藥量

(A) 個別投藥法 (本法是指對一個雞一個雞分別來投藥之方法) 投藥一次以後需要休息二個月後再用。把規定量(下圖)之「阿司卡利肯」混入飼料中或做練餌給與之。

生後90天以下
之雞不可吃



病雞及預防注射前一週及注射後三週以內之雞不可吃



小雞(生後90天以上)
一隻一次0.2公分



中雞(體重1.5公斤)
(藥斤2斤半以上)
一隻一次0.3公分



大雞(體重2公斤)
(藥斤3斤4兩以上)
一隻一次0.5公分




(B) 雞群投藥法 (每天一次二日服完 (共用二次) 以後休息二個月後再用)

對多數之雞同時投藥的時候要比個別投藥量減少一半計算而混入飼料中充分攪拌後才給與。(因為雞群投藥之時有強弱不同之雞而強壯之雞會吃多，所以要比個別投藥量減少給與)

例10隻之雞
群投藥量
之計算法

小雞1隻之投藥量	0.1 公分	× 10 隻	= 1 公分 (即是一匙平平)
中雞1隻之投藥量	0.15 公分	× 10 隻	= 1.5 公分 (即是一匙平平再加半匙)
大雞1隻之投藥量	0.25 公分	× 10 隻	= 2.5 公分 (即是一匙平平再加半匙)

飼料和藥充分攪拌



把藥平均混和

飼料

阿司卡利肯 (後接底裡)