


鳳梨的優良系統


——瑞榮黃——

鳳梨不良系統，多數都能遺傳給下一代，所以在採苗前，應切實注意淘汰，以免傳佈繁殖。以下圖樣，都是有遺傳性的不良系統。




(三) 混目：

這類果實，由正常小果，和正常小果混合而成。正常小果有果肉，不正常小果和果心一樣。果實很小，品質也不良。




(一) 多

番芽(三菱系)：番芽特別多，每株可多到十數株，有時果實完全被包圍。果實比正常開英種較小。疣目也多。



(四) 鱗目：

全由小果荷形成果實。外皮好像魚鱗，所以叫做鱗目。果實小而沒有果肉，大部份為果心，除供以觀賞用外，沒有利用的價值。



(二) 疣


目：果實的下部着生小果，小果形狀如疣，所以叫疣目，大的有四公分以上。疣目，在輸送時容易擦傷腐爛，並且還有阻碍果實肥大等種種弊害。

。手一接觸菌核，便會附著很多黃綠色的粉末。稻麴病發生在齊穗期。莖葉綠色較濃的稻穗，有的一穗中，有一、二粒到三幾粒患有這個病。病原菌最初潛伏在穗內，發育後，從穗的空隙處露出淡青黃色的粉塊，經過數日漸漸膨大，向穗的週圍包圍，形成菌核。菌核落在地上，可能在原地越冬，到次年七、八月


稻麴病

陳楚山


環境適合時，藉空氣作媒介再回到稻穗上。稻麴病，是一種病，決不是豐收的象徵，希望農友們注意防治。播種前把種子浸漬在一千倍液的谷仁樂生一小時，然後取出洗乾淨才播種，這樣可以預防稻麴病的發生。發現稻麴病時，應立即把病穗摘除。接觸到病穗的也應摘除。把粉末落在地面。病穗應集在一起燒掉。在穗孕期及齊穗期，各撒佈一次六斗式波爾多液（六斗水，硫酸銅四五〇公分，生石灰四五〇公分），也可以防治。



(八) 玉蜀黍型（番麥梨）：果形細而長，果實頂端沒有冠芽，小果的排列和五目系統相同，由八列×五列構成。小果凸目像玉蜀黍，果肉色濃黃，但大部份為果心，沒有利用的價值。




(五) 抱子梨：果實細長，基部着生小果實，所以叫做抱子梨（子持バイン）。果肉全是纖維而且堅硬，除觀賞用外，沒有利用價值。




(六) 五目：果實很短，果目少而粗大，每行三到五目，所以叫做五目。小果排列只有八列×五列，品質雖較優良，但果實小而短。



(七) 垂葉：葉片比較薄弱，都向下垂。葉中央部份，有紫紅色帶有綠色的綫紋。果實很小，小果稍成凸目，品質不良。



(九) 雞冠芽：果實形狀像扇形，很多冠芽聚生在果實頂端，形狀像雞冠芽，所以叫做雞冠芽。果實內果肉很少，大部份是果心。除觀賞用外，沒有利用的價值。



(十) 多葉性（鳳梨雄）：葉片短而數目多。從種植到結實期間比較長，所以有些株莖長至六十公分以上。果實很小，叫做石梨。有的植株完全不結實。