

洋蔥收穫後的間作

—— 根 阿 ——



播種後二十五日，可開始施肥。每公頃約施硫酸一五〇公斤。在發育期間，最容易發生捲心蟲為害



友農從丁

易利用種植別的作物，以致一般農友往往把這個過渡期間放室。其實，這過渡期間，可利用播種一種利潤很大的蔬菜。據去年在雲林縣臺西鄉，栽培洋蔥成功的丁從農友的經驗，他利用洋蔥收穫後的空地，栽培四十日馬耳種蘿蔔共〇・三公頃，收穫八千餘公斤蘿蔔，賣得八千餘元（以實價每公斤一元計算）。現在把他的經驗，介紹給各位農友做參考：

四十日馬耳種蘿蔔的播種適期是四月上旬到六月。砂質壤地較好。洋蔥收穫後，耕翻一次，就可播種。如果前作物不是洋蔥，應在耕翻前，每公頃施基肥五千公斤。

播種二星期後，幼葉四、五葉時，可開始間拔，拔去不健全的幼苗，株距以五、六寸為宜。

近年來，洋蔥已經成為農友們最關切的一種新興農作物。現在，各地已進入收穫期，但是洋蔥收穫後的土地，到下一季作物播種以前，還有一、二個月的空閑期，可是，這段時間過短，不容易利用種植別的作物，以致一般農友往往把這個過渡期間放室。其實，這過渡期間，可利用播種一種利潤很大的蔬菜。據去年在雲林縣臺西鄉，栽培洋蔥成功的丁從農友的經驗，他利用洋蔥收穫後的空地，栽培四十日馬耳種蘿蔔共〇・三公頃，收穫八千餘公斤蘿蔔，賣得八千餘元（以實價每公斤一元計算）。現在把他的經驗，介紹給各位農友做參考：

，發見為害時，就用DDT二五%乳劑加水一千倍噴射。

播種三十八天後，便可以開始第一次收穫。最慢，在四十三天內，也能全部收穫。收穫後，仍有很充裕的時間可以整地，準備下季作物的播種。

人工育雛參考表

· 小林 ·

天七廿、六十第	天六第	天五、四、三第	天二第	天一第	時間期別	重量	溫度	注意	事項
期毛換次一第	期險危次一第	期	雛	幼					
分公三九	分公六四	分公三四到五三	分公五三	分公四三到十三					
度五八氏華	度五九至度十九氏華								
⑤乳。④飼料多加些魚粉，貝殼粉和牛、羊。③體內缺乏無機鹽類，應該補充貝殼。②食慾不好。①天氣良好時，要使日光浴。	⑥紅門附著白雲的小雞，必須淘汰。⑤經常備置木炭粉，牡蠣粉和腐葉土，使自由啄食。④如發現吃下飽的小雞，要隔離飼養。③飼料加些胡麻。②夜間吃下飽的小雞，要量不要多。①飼料用給餌厚紙，改用給餌用器。	④切細青菜隨時餵給。③食。②用開水混合飼料，塗在厚紙上使啄。①飼料混合標準：穀粉六十%、麥皮二十%、米糠十%、魚粉十%、骨粉少許、食鹽少許。	④清水。③注意保溫。②中午和下午四時，餵給蛋黃加些玉蜀黍粉。①早上八時餵蛋黃。	⑥每次給飼料時，不要超過二十分鐘。⑤八時給飼料一次，下午四時再給一次。④把煮熟的蛋黃，撒在厚紙上，早上候才給飼料。③把煮熟的蛋黃，撒在厚紙上，早上候才給飼料。②等到動作活潑，自己找東西吃的時候才給飼料。①把腹中的蛋黃消化。	時間期別	重量	溫度	注意	事項

天十六第	天十三第
期雛中	期毛換次二第
三三五公分	分公八八一
度溫然天	度五八一十八氏華
③②①危險期已過。③食慾增加。②換毛完畢。	①最危險的時期已過。②不要密飼，每日每坪（六尺四方）最好飼養一隻。③飼料中，可以減少穀類增加糠類。④飼料混合標準：甘藷粉十%、魚粉十%、餅二十%、糠三十%、骨粉十%、食鹽少許。⑤慢慢降低溫度，由晚上先廢，每星期降低五度。並注意換氣。

增產的一方法是用新農藥

△洋蔥、蕃茄（立枯病、葉枯病）等一切病
△茄子、瓜類（露菌病、腐敗病）害特效藥

△稻熱病、菌核病特效藥
△裕米農石灰、施利散石灰

△最新超強力殺蟲劑
△羅拉吉旺 乳劑、粉劑

△E.P.N水和劑、P.M乳劑
△有機磷新殺蟲藥

△馬拉松 乳劑
△驚異的最強力殺蟲劑

△鼠拉倒爾
△夏秋季各種優良蔬菜種子將在進貨

（四五年產商品目錄附郵票一元函索即寄）

☆謹告遷移

本公司業務日見擴展，原址不敷應用，自本（五）月一日起遷往（通化街一段八六號）（即第一商業銀行大稻埕分行對面）繼續營業敬請賜顧諸君及各位農友多多指教，倍予關照為禱

臺灣農產企業公司 同啓

臺北市通化街一段八六號

電話：四四二五三號

臺灣農產企業公司 同啓

臺北市通化街一段八六號

電話：四四二五三號