

業副好種一是鵝養



季培元

養鵝可利用家庭剩餘勞力，婦女幼童都可以照顧。所需鵝舍設備簡單，飼養又不難，通常除產卵鵝和小鵝時期補給飼料外，只要放飼在田野或河邊的草原上覓食就可以，因此養鵝的成本很少，鵝的生長又很快速，是簡易有利的家庭副業。

一、鵝蛋的孵化

孵化用蛋要每天收集一次，保存在較冷的場所，保存時間不要超過一

星期。畸形蛋或過大過小的蛋都不能留作孵化用，染污蛋要拭淨後再放入孵化。孵化工作，也可用普通賴抱母鵝、火鵝或鴨代孵，一隻母鵝一次可孵四到六個鵝蛋，一隻鵝就可孵十到十五個鵝蛋；這要看鵝體或鵝體的大小和季節而不同。

用普通賴抱母鵝孵蛋時，孵前要先驅除賴抱母鵝的外寄生蟲。因鵝蛋的孵化期，比雞的孵化期多一個星期，不好的賴抱母鵝，可能孵至第三星期就起抱，影響鵝蛋的孵化，所以要選擇賴抱性優良的母鵝來孵蛋才可以。

孵化鵝蛋，濕度較孵化雞蛋為高，所以要補加水份。普通利用火雞或母鵝孵化時，可用微溫水噴洒在鵝蛋上或孵巢內，當孵化到後期十到十四天中，每天要噴洒微溫水一次。如用母鵝自己孵化，而鵝每天水浴，就不須另外補加水份。孵化經十到十四天後，照蛋，移去無精蛋和死精蛋。

鵝蛋的孵化率，不如雞蛋好，普通只有四〇到六〇%。但是受精率一般都很高，約有九〇%。鵝的孵化期為二八到三一天。小鵝孵出後，不要

廣告

英阿發的增產故事

小羊



馬上移出，最好到第三十二天的早晨才放出。

鵝的人工孵化器，和雞的稍不同。鵝人工孵化的溫度為華氏九十九、二五到九九、七五度。人工孵化期間，轉蛋要完全，普通要轉一八〇度的角度，轉蛋每天四次。轉蛋可浸在微溫水內，以補充水份，每星期二次，每次約半分到一分鐘，但千萬不要超過一分鐘。孵化器內的濕球維持九〇度，一直到第二十六天，再把濕度增加為九二到九四度。孵化經七到十天後，移去無精蛋和死精蛋。到第二十六天，停止轉蛋，就放入孵化器內盤子中。死胎要移去，以免腐臭，影響其他的蛋。小鵝孵出後，也在第三十二天早晨放出，開始給食。

二、飼養和管理

初生鵝，要養在大小適當的防雨兩棲棚。在第一個月中的小鵝，不要受到雨淋，要保持小鵝羽毛的乾燥。在二到三星期內，每天早晨，要等到草地乾燥後才放出，以免受濕。小鵝在沒有長滿羽毛以前，禁止入水游泳。萬一小鵝被雨水淋濕時，須要設法烘乾，以免受涼。帶小鵝的母鵝，在二到三星期內，要關在屋內，而小鵝可自由出入，在外運動；但不要使牠離開母鵝太遠，並且窩內要保持清潔乾燥。

三到四天大小的小鵝，可使它吃嫩的青料。二到三星期後，需要供給少量的飼料。放飼時，要注意貓、狗的侵襲，和遺失。

小鵝的雌雄，不易分別，普通要到產卵前才可看出。一般說來，公鵝聲音沙啞，頭較大，腳較粗，身體肥滿，頸也較粗大。相反的，母鵝頭細，腳、頸較細，聲音響亮。普通在雛鵝出生後第一天，開始給食前，可自肛門內鑑別雌雄，方法和雞鵝的肛門雌雄鑑別法相似。

小鵝孵出後不久，可餵生長飼料；也可用普通鵝的生長飼料。其他還須給相當量的嫩青料。如給粉料，就要加些水拌濕後餵飼。要經常供給清潔飲水，不可缺少。

小鵝在第一週內，一天給飼料三到四次；第二週到第四週內，一天給二到三次。飼料分量，以在十五分鐘內能吃完為最好。在飼料槽旁，要放一盤細小的砂石，以供啄食。水盆內的水的深度，以浸沒嘴喙為好，但也可以深到浸沒頭部。出生二到三星期後，如有足夠的嫩草供給，飼料可酌予減少。飼料量，隨青料的質和消耗量而定；如有好的青料，採食量又多，飼料量就可減少。

出生後六星期，通常只給青料。但是如補給生長飼料，生長會更好。六到八星期後，可不用防雨的棲棚。

如果沒有好的草地，就要補給品質良好的青料如青菜等。

種用鵝，要有好的草地放飼。在冬季野草較少時，要補給飼料；一天給與一次。

三、屠宰前的肥育

鵝在出賣或屠宰前，最好施行肥育。因為鵝平常放飼吃草，不給飼料，因而身體瘦小，肥育就是供給飼料，使鵝自由採食，變成肥滿。肥育工作，普通在屠宰前三到五星期舉行。肥育季節最好在冬季。肥育不但可增加體重，並可增進鵝肉的味道。母鵝可留作種用。小公鵝和較老不適宜作種用的鵝，通常在肥育後出賣或宰食。凡作過種用的，不要施行肥育。小鵝長到羽毛豐滿，或翅羽已長到尾部時，就可開始肥育。有些生長好的鵝，出生後十到十三星期，體重可達七到八公斤。十到十三星期後的生長，不如幼小的時候快速。

鵝的肥育，一天給

三次肥育飼料。這種飼料，普通為粉料。一天給二次粉料和一次粒飼也可以。餵飼時間要一定。肥育時期，不要多運動。青料只須給少許。如鵝關在室內，就要鋪稻草，保持清潔，飲水也要充分供給。

特殊肥育法，是把飼料用人工填入鵝胃內。這個方法，費時費工，但肥育成績較好。

臺灣大蟋蟀

許先助

「臺灣大蟋蟀」(タイワンオホコウギ)為害農作物相當嚴重，防治又很費時，這裡介紹一種使用BHC粉來防治「臺灣大蟋蟀」比較簡單，省時間而又有效的方法。

毒餌的配法 每分地，準備甘藷油，和甘藷簽攪拌，增加甘藷簽的香味，然後再用半斤的有效成份一%的BHC粉混合攪拌均勻。製成的毒餌，如有強烈的藥味，最好再加入少許芝麻油。毒餌的另一個調製方法是：用含有有效成份六、五% BHC水懸粉，加水稀釋三〇〇倍，浸漬甘藷簽。甘藷簽取出陰乾後，再拌芝麻油待用。

散佈方法 在農作物還沒種植前，在黃昏時，把毒餌平均散佈在田間就可以。巢孔較多的地方，多撒些，巢孔較少的地方，可少撒些。臺灣大蟋蟀咬食毒餌後，就在地面上中毒死亡。

注意事項 ①絕不可把中毒的大蟋蟀帶回飼養家禽，以免發生危險。②在住宅附近、家禽易到的田地不要撒佈毒餌。③下雨時，大蟋蟀不出來尋找食物，所以在下雨時，不要撒佈毒餌，以免浪費。