

實將成熟，或已成熟時，開始呈現病徵，一直到果實相當大時（約三個半月左右），病菌才無法侵入為害，所以，在這容易受害的期間內，都應按時撒佈藥劑，而第一次撒藥時間，應在花落後一星期內舉行。

經試驗結

果，最有效而經濟的撒藥次數是五次；在第一時間最好在晴天清晨。假如在撒藥後下大雨，就應在雨後重複撒藥一次。果園內的落果、葉片、和枝條等，都潛有病原菌，是病害傳播的媒介。除撒佈藥劑外，還應次撒藥後，每隔隔三星期左右，再撒佈一次，直到第五次撒藥完畢為止。撒藥經常清除並燒毀果園內脫落的果實、葉片，和枝條。



夏季栽培番茄

郁宗雄

本省七月到九月間，溫度最高，雨水最多，番茄栽培最易成功，果實生產最少。七月裡結果的在八月採收，九月裡結果的在十月裡採收，所以番茄市價，每年八到十月最高。八到十月，是西瓜的盛產季節，但是西瓜只能作水果，而番茄可兼作水果和蔬菜，並且滋味不同；所以西瓜盛產，並不會影響番茄的價格。

溫度、雨水和光度，會限制番茄的栽培。在夏天的高溫下，普通番茄品種，大多不會結果。連續的下雨，會沖刷土壤，使番茄根部露出地面，以致枯死；或者因為番茄根部浸水過久而腐爛死亡。雨季的光度微弱，因此植株生長不良，結果很少，或者全不結果。

雨季來臨的時間，年年不同，所以，對夏季栽培番茄的影響也不一樣；如果雨季來得較晚，夏季早種的番茄，可能已經收完而不受影響，但是晚種的就要失敗；如果雨季早到，早種的就有失敗的危險；如果夏季雨水分佈均勻，沒有連續下大雨，栽種番茄也就較易成功。本省北部，夏季並不像南部那樣長久下雨，所以栽培番茄也比較安全。

臺灣夏季：只要注意下列幾點，栽培番茄還是可以成功：

- ① 選耐熱性品種，如農林廳今年獎勵試種的「馬娜里」Manalee 和「馬娜露西」Manalucie 二品種；臺南改良場試作成績良好的「夏生」Summer Prolific 和市場上有賣的「夏光」，都可能栽培成功。
 - ② 選擇高冷地栽種。
 - ③ 選擇排水佳良的砂質壤土高燥地栽種，不要種在低濕地和砂土或粘重土。
 - ④ 作一尺以上的高畦。
 - ⑤ 勤加灌水，使根部習慣潮濕土壤。
 - ⑥ 多施堆肥作基肥，以改良土壤物理性質。
 - ⑦ 栽種後，在畦面敷草，以防止雨水沖刷和日光曝曬。
- （虎尾馬端浩先生詢問番茄的夏季栽培，本社特請鳳山熱帶園藝試驗分所郁宗雄先生撰成此稿。）

附註：使用石灰波爾多液，請參考本刊五卷十二期十頁「農藥混用的忌避」表。
更正：本刊前期第十二頁廣告，製造好速殺水和性粉劑的美國加州農業化學公司，「州」字誤排為「洲」，特此更正。



⑥ 醫問生食甚麼？已食了有幾時？
阿招痛（紅眼）記記紅眼招阿時？
那（淚流）滴屎目（哭邊講邊）那

⑤ 阿招痛後吐食棕甲（瀉吐），因，
為獸藥藥食；食不了時腹痛，
險無救誤生！

④ 阿招痛（愛）孫紛紛就，
藥來醫孫；食藥也要分寸，
豈可獸藥當藥吞？