

注意防治猪肺炎

農林廳畜牧科家畜疾病診斷所

猪肺炎是可以預防的。萬一患猪肺炎，只要早期發現，及早治療，也不難恢復。



猪肺炎的原因非常複雜，由細菌或濾過性病毒引起。據本省過去的經驗，患肺炎的猪隻，常發見有四到五成猪瘟病毒混合感染。並且，很多場合都是猪瘟為病猪的主要原因。

一、預防要緊

(1) 預防打針：引起肺炎的細菌雖然很多，但是這些細菌都有若干共通性質，所以在所用菌苗，也可幫助預防各種細菌的病害。這種菌苗，應在四季氣候變換前，或運輸猪隻二星期前使用。猪瘟預防打針，仍應按時舉行。

(2) 注意飼養管理：感冒是萬病的起源。四季交接氣候變化時，應防止冷風吹進猪舍。此外，猪舍還應多放些稻草為猪隻保暖。飼料營養份應充足，在運輸前後，須考慮猪隻體力和管理；休息和增加營養，是恢復猪隻體力唯一的方法。飼料不可急激的變更，以免影響猪隻食慾，減弱體力，引起肺炎。猪隻的環境衛生應特別注意；猪舍內最好鋪良好的混凝土床，要每天打掃清潔，不可使猪隻在潮濕污穢，充滿細菌的環境中生活。

(3) 防止病毒侵入：嚴禁閒人和其他禽獸接近猪舍。不可由瘟疫區買進猪隻、猪肉和飼料。新買來的猪隻

，須隔離飼養一到二星期，如看不出病徵才可和舊猪隻一齊飼養。

二、治療的要點

猪肺炎的原因很複雜，因此，治療很困難。但是如果在發病初期，施以化學療法，使用磺胺類劑、抗生素和血清類等治療，就可恢復。治療時，用藥量應該充足，而且要使用多種藥劑，繼續用三天，使病猪熱度降低，呼吸恢復正常為止；如果有效，應再繼續投藥三到四天以免再發，如果無效，就應更換藥品才行。病猪的保溫，和營養的增加也是不可疏忽的。萬一病猪轉變慢性，如體力還強，菌苗的反覆注射有時候很有效果。

藥品的選擇和使用量，應請獸醫指示。病猪如有猪瘟混合感染，最好不要醫治，而應撲殺燒滅，以防止猪瘟蔓延，並應報告鄉鎮公所派員實施附近猪隻緊急預防注射。(李太神)



形情針打防預猪小



輕重有量藥症病，清認要藥獸藥人 ①
來請生醫，生醫請（當應）愛趙病有；
。明分（斷診）斷

救急時即，明高有術技生醫 ②
（神精）英精人後以腸洗；清洗腸
！症過來毒中得免，（快爽

聲大看見生醫，藥猪是食所棕阿 ③
無，藥用亂孫痛（母祖愚）媽：叫
！笑可真女婦知