

# 如何栽植木瓜

## 本邦載

(續上期)

### (四) 定植的要點

一、做畦 排水良好的山地或平地，可以不必做畦。排水不良地，要築成四十到六十公分高畦或土堆，以防止雨季根部腐爛。

二、定植穴 新開墾或土質較鬆肥沃的土地，可不必修定植穴。土質不良的，就必須挖穴施肥補救。

三、定植距離 定植法，普通有三角形和方形兩種。三角形較方形，同一面積可多栽百分之十五到二十；因此產量也比例的增加，普通多採用方形。山地傾斜度較大的地方，株行距可用三公尺；平坦地可用二、五公尺。

四、苗木處理 高十五到二十公分的小苗，在乾燥期，宜帶土定植。在雨季，可不必帶土也不必摘葉；但根部不宜折損過多。高三十到四十公分的大苗，不論乾燥期或雨期，都要摘葉，雨季摘除下部大葉三分之一到四分之一，乾燥期摘除二分之一到三分之二。如天氣乾旱，根部折損過多，定植後又無法澆水，就應摘除更多的葉，只留頂部新葉數枚，最為可靠。六十公分以上的苗，須經遠距離運輸時，不必帶土，但應把




法方的植定株例

株高五十一到一〇〇公分時，雨季每月除草一次，乾燥期每年除草六次。株高一五〇到二〇〇公分時，雨季每年除草六次

### (五) 除草、中耕、施肥

五、倒株定植法 山地栽培，可採倒株定植法，能使結果高度減低，防禦風災。主幹和地表成四十五度傾斜，摘除和地面接觸的葉片，定植深度應和原有深度相等。



形情肥施伏環

乾燥期每年四次。二〇〇公分以上的成齡株，雨季可減為每年四次，乾燥期三次。定植後到一公尺高度以內，每月要中耕一次，可在鋤草時同時進行。開花以後，如無多餘勞力，可以中止中耕。開花以後的成齡樹，每年可施肥四次，就是三、六、九、十二月各施一次；每次每株用硫酸銨八十分、過磷酸鈣一三二公分、硫酸鉀六十六公分。為節省勞力，也可把全年肥料用量，只分兩次施用，就是在五、八月各施一次。高度二公尺以下的樹，可用環狀施肥。株間葉部互相接觸時，可在株間掘一直溝施肥。中耕和施肥部位，以正午日光照射樹上，所成環形陰影的邊緣附近最為適當，所須深度為十五公分，寬約為二十到三十公分。

預告：由本文同一作者撰著的「本省木瓜優良品種」一稿，即將於近期發表。

# 利美農

(殺蟲乳劑)



敬謝熱烈的惠顧！  
風行全省 信用第一！

### ◎本劑特長

- 一、殺蟲力最強、最速、經濟實惠。
- 二、對各種農作物的害蟲類(跳蟲、蝨、龜蠅、蟲類)均有滅滅的特效。
- 三、瓜類、蔬菜、幼苗蟲害等均可使用，保證絕無藥害。

「保證效能、無效原金退還」

(稻熱病特效藥：水銀製劑)

セレーサン石灰：セレーサン水和劑  
各地農會、種子行、西藥房均有代售

永光農化工業社

臺中市中國區成功路248號 TEL 499號