


分(一臺尺半)，十公畝地栽種三千二百株(農家品種株形寬大，十公畝只能栽二千三百株)。因下午四時以前天熱光強，苗易萎死，所以栽種時間應在下午四時以後，帶土掘苗，掘苗後應立刻栽種，栽種時盡量保持菜苗上的土球，栽種後立刻澆水。

(四) 施肥和管理的秘訣 「鳳山極早」和「鳳山秋播早生」，自定植後至收穫期時間很短促，也就是每日生長量很大，所以如有一天因缺水或缺肥而停止生長，便影響植株和花球的發育，收穫期也會延遲，這是栽培失敗的主因，要特別注意。

(1) 肥料要多施 「鳳山秋播早生」在田間生育期只有五十天左右，「鳳山極早」只有四十天至四十五天，所以肥料須用速效性的才能發揮效力；堆肥須用腐熟的。又生育期，因多雨，土壤易被沖刷和堅實，所以堆肥應多用。「鳳山極早」和「鳳山秋播早生」都是適應多肥栽培的，肥料宜稍多施用不可短少，少肥時株形就不能充分發育。十公畝地肥料用量如左表(單位公斤)：

說明	硫酸鉀	草木灰	過磷酸鈣	人糞尿	硫酸銨	腐熟堆肥	肥料總用量	基肥用量	追肥量				備註	
									第一次	第二次	第三次	第四次		
指中等肥沃土壤之用量	二〇	一五〇	五〇	三〇擔	一〇五	二〇〇〇	二〇〇〇	二〇〇〇	一五	一	一	一	一	指乾糞者，如為濕潤者，須一〇〇〇公斤 亦可利用氯化鉀 肥料種類和施肥法亦可參照農家慣例，但肥料三要素成分應依此為準。
栽種前十日整地時即施入基肥條溝內。	一	一五〇	二〇	一	三〇	二〇〇〇	二〇〇〇	一五〇	一	一	一	一	一	
空植後六日作液肥澆在穴中。	五	一	一五	一	一五	一	一	一	一	一	一	一	一	
第一次追肥澆在穴中。	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
第二次追肥澆在穴中。	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
第三次追肥澆在穴中。	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	



日中生育，所以澆水最為重要，尤其這二新品種，生「都在高濕烈水宜兼顧 「極早」和「秋播早生」都在高濕烈

第三第四次追肥施肥期，應視植株生育情形而定。「極早」應施用較早，「秋播早生」應施用稍遲；第四次追肥期總在花蕾發育始期。化學肥料作液肥施用時，土壤濕時加水二百倍，土壤乾時加水三百倍。

(2) 澆水排水宜兼顧 「極早」和「秋播早生」都在高濕烈

### 臺灣農產的最優良菜籽!!

是在土壤較濕狀態下所育成的，土壤乾燥時，對植株和花球的發育有很大的抑制作用，如遇降雨時，根部就容易腐死。澆水宜勻，務使土壤經常保持半乾濕狀態，使根部習慣於濕潤土壤中生，這樣將來雖遇連日降雨，根部也會有適應性不會腐死。降雨時應注意排水，務使田內雨水，迅速排出，不要使停滯在畦溝內。雨後不久，田土仍濕時，不可入內工作，以免踏壓土壤使根部受損。

(下接第九頁「鳳山白菜」文後)

鳳試極早生花椰菜      ◎彰浦早生包心白  
 ◎極早生獻上花椰菜      ◎鳳山夏天白菜  
 ◎臺農早生花椰菜      ◎黃金夏天白菜  
 ◎喜樹早生花椰菜      ◎四十天油茶  
 ◎美國早中生兼用花椰菜      ◎加州大蕃椒  
 ◎極早生金實甘藍      ◎紅玉王大蕃椒  
 ◎大型早生甘藍      ◎豐農節成胡瓜  
 ◎馬耳四十天蘿蔔      ◎交配福壽二號蕃茄  
 ◎大白拔長蘿蔔      ◎結球高苜  
 ◎冬瓜白長蘿蔔      ◎嫩莖萵苣(萵苣)  
 ◎其他各種優良種子，農具，農藥均有「四十五年度總目錄附郵票一元函索即寄」

臺北市迪化街一段八六號

輸入元 臺灣農產企業公司  
 直賣部 臺灣農業資材公司

郵政劃撥儲金(農) 一九五三  
 農業資材 二七九九  
 電話四四二五三號