


甘藍優良品種

——點要栽培的號一配交岡長——



——王進生

長岡交配一號是優良的甘藍新品種，去年，臺北至嘉義各地農友試種，成績很好。依據臺北區農林改良場幾年來的栽培成績，每分地產量五千至六千公斤，比三池中生，成功(サクセツション)及本地種，約多收穫一倍，尤其夏季栽培在高冷地的，成績特別優良。本品種在高溫下結球良好，品質優良，球形扁圓，適合本省市場需要。普通在定植後八十至一百天就可收穫，球重為二至三公斤，但疏植時，可大到三至四公斤。本品種的耐寒性及低溫結球性較弱，因此，在一、二月間結球時，如有寒氣襲擊，結果就不好。

長岡交配一號，可和一般甘藍品種一樣栽培，

但是為發揮本品種的優良特性，請注意下述栽培的要點：

(1) 每分地一兩菜種

本品種是第一代雜種，所以種子比一般品種約貴五倍。為了節省種子費用，必須知道單位面積所需種子量。根據臺北區農林改良場的試驗，一般農家要栽培一分地的本品種甘藍，最好準備一臺兩的種子。

(2) 苗床施肥與播種適期

平均溫度攝氏十五至二十一度為本品種的發育適溫。高冷地夏季栽培的播種期為二月下旬至三月下旬，平地中期栽培的播種期為八月下旬至十月上旬。要播種一臺兩種子，須要準備播種床二坪，假植床二十坪。二坪播種床施用腐熟堆肥二十四公斤，過磷酸鈣及草木灰各〇.五公斤，和豬糞尿或水肥二十公斤。二十坪假植床施用二五〇公斤腐熟堆肥，十二至十五公斤豆餅，四公斤過磷酸鈣，五公斤草木灰，和二〇〇公斤的豬糞尿或水肥。播種床床面平整後，每隔六公分作一淺溝，把種子條播入溝。菜苗二片子葉展開至本葉一、二葉時，可以假植。假植株行距皆為十二公分。

(3) 注意防治苗期病蟲害

平地中期栽培的播種期氣溫過高，容易發生病蟲害

請用美國純美化學公司出品



肥羅歐

必能使你增加收入

- 促進生長 35%
- 增加飼料利用效率 10%
- 減少疾病損失
- 抑制因氣候轉變，預防注射，環境變換等所引起之繼發性傳染病

總批發：新臺畜牧獸醫服務社

臺北市中山北路一段35號二樓 臺北郵箱410號

屏東分銷處 屏東市維新里成功路125號

農會，飼料行均售

；如立枯病，根朽病，菜心螟及蚜蟲都可能發生。為減輕病害，種子在播種前，最好和阿拉散 (arsan) 或殺滅散 (scimesan) 粉末混合消毒，然後才下種。通常，是用約二分之一茶匙的阿拉散或殺滅散粉末，與一磅種子混合。(註：一磅約等於四五〇公分或十二臺兩) 阿拉散及殺滅散，本省還沒有出售，如果農家備有斯巴貢 (スバゴン)，可用斯巴貢代替，混合比例和阿拉散，殺滅散一樣。

苗床在播種或假植二至三日內，每坪須撒佈大約五公斤的一，〇〇〇倍水銀製劑烏斯普龍 (ウスプルン)。

苗床期的菜心螟及蚜蟲，最好使用 DDT 或除蟲菊防治；發芽初期，每天澆水後，可撒佈 DDT 粉末預防菜心螟產卵，以後按苗的發育程度，酌減撒佈次數，到苗期的後期，可每隔數天撒佈 DDT 乳劑八〇〇至一，〇〇〇倍液或除蟲菊乳液一次。