


下面分幼木茶園和成木茶園說明剪枝的方法：

(甲) 幼木茶園的定型剪枝：本節中附有的幾個圖，表示茶苗定植後八年內，每年應怎樣剪枝的情形。每一圖右邊是沒有剪枝的茶樹，左邊是剪枝後的適當高度及其樹型。

① 定植後剪梢：茶苗定植後，如圖1所示，立即把枝梢帶葉平剪，高度以離地面二十公分左右為最好；但也因品種、苗齡、地勢、土質等而稍有差別。在寒冷多雨的地區，而且苗木細小時，定植後不剪梢也可以。

② 定植後一年剪頂：定植後約一年，如本省茶農多於十二月或一月定植，就在十一月下旬時，如圖2所示，把離地面二十五公分以上的枝葉全部剪除，這工作叫做「剪頂」。中央生長特別強盛的主枝，應再剪頂八公分（就是剪到二十一公分高），壓制中央主枝的迅速上長，促進側芽的發育。


③ 第一次和第二次橫剪：定植後第二年及第三年的冬天，各分別舉行一次橫剪，於離前一年剪枝面上十至十五公分處平剪，並且把剪



運啓者：拙作「兩種優良的花椰菜新品種」業在貴刊六卷十二期刊出，至感，惟新品種之名稱，原來為「鳳山特早」及「鳳山早生」，經貴社改為「鳳山極早」及「鳳山秋播早生」，其中「鳳山特早」改為「鳳山極早」並無不可，但「鳳山早生」如改為「鳳山秋播早生」者不妥，因此品種播種適期在七、八月間，至秋季九月後即不適於播種。又「鳳山早生」刻在此間作播種期試驗，似尚可於四月上旬播種（此點尚未達確斷階段，但「鳳山極早」即在四月上旬播種已成功，臺南市農會之農場所栽二萬株，即可收穫上市）故「鳳山秋播早生」之品種名，仍更正為「鳳山早生」，以與品種特性及農會推廣之名稱相符，此致
農年社編輯室
鳳山熱帶園藝試驗所 郁宗維啓

來函照登

枝面下部的弱枝剪除(如圖3和4)。假如發現徒長枝如圖4所示，就要在橫剪面下八至十四公分的地方加以深剪，促進側枝的伸張分佈，使定植在貧瘠土壤上的茶苗，在定植後三年或四年能培育成如圖4左圖所示：樹高四十五公分，樹冠(剪枝面)直徑六十五公分的優良基本樹型。自茶苗定植至基本樹型構成的幾年時間，可以說是茶樹的「童年期」，也可稱為「定型期」，在這童年期，應適當的施肥，避免採摘。目前本省茶樹所以普遍矮小，茶農們於此童年期中採摘過度，可以說是最主要的原因。請茶農們注意，定植後第一年絕不可以採摘，第二及第三年內，也只能在春茶及夏茶末期各摘心一次，使幼苗充分發育成長，使主幹強壯粗大，側枝分佈適度而均勻，使將來採摘面開展。
(未完，下期續)



告報會開，來生學集托師老 ⑥
(壞)呆無是然雖水酒；知家人
• 害厲真命生係關

來走師老，知這去有向主等 ⑥
救來(們他)因將緊趕；邊溪到
• (氣斷)絲氣無經已人二，起

怎既實是但，酒曉會然雖泉阿 ④
時一，(拉)托相來中溪人雙；救緣
• 手捉共脚捉