

洋葱的仔球栽培

郁宗雄

今年本省洋

葱生產過剩，有

些種洋葱的農友

，可能遭受損失

栽種法，可以在

十月收穫，趕早

市，增加收益。

這裡介紹仔球

同的栽培法：一是

直播栽培，用種子

直接播種到田間生

產仔球；二是移植

栽培，種子先播到

苗床育成綠苗，再

移植到田間栽培生

產仔球，這是臺灣

普通的栽培法；三

是仔球栽培，先把種子播到苗床或田間，養成

仔球，仔球收穫乾燥貯藏後，再移植到田間裁

培，生產仔球。仔球也叫乾球或小鱗球，就是

還沒有長大的小葱球，所以普通栽培賣不出去

的小葱球也可以作仔球使用。

洋蔥仔球栽培，在八、九月栽植，可以在

十月裡生產仔球，提早供應市場，市價較高。


又，八、九月播種洋蔥種子，苗期

易受高溫多雨及病蟲為害，但用仔

球在八、九月栽植，就很安全。

一、「早玉」適於仔球栽培

利用仔球栽培，以「早玉」較



法培栽種三的葱洋

產形狀優良的大葱球。今年秋天將推廣的「聖哇奎」(San Joaquin)品種，也可利用仔球栽培。「黃勝」就不適宜作仔球栽培。

二、播種適期和仔球培育

仔球適宜的播種時期，平地是在十一月中旬至十二月下旬，過早過晚都不好。高冷地海拔一千公尺以上的播種適期，在十二月或三月上旬，如在一、二月播種，因溫度太低，種子發芽不良。

培育仔球的苗床方式和管理方法，可和普通培育綠苗的苗床相同（參看本刊五卷十五期「實用洋蔥栽培法」）。育成三萬仔球（可供十公畝地栽種）所需的苗床床面面積，大概為五十平方公里（平均株距四公分，育成較小仔球）至七十五平方公里（株距五公分，能育成較大的仔球）；所需種子量為六至八臺兩。


三、仔球的收穫和貯藏

仔球生育到地上部黃萎時，就可收穫。仔球收穫後，晒乾至葉部完全休眠，選擇沒有傷害，沒有病害，有光澤，橄欖形（指早玉品種）的，剪去枯葉，放入淺盤內貯藏。如果不剪去枯葉，每二十個仔球結束莖葉在一起，吊掛在通風乾燥的地方貯藏也可以。

平地四、五月收穫的仔球，可能有百分之六十溫下貯藏至八、九月栽植，可能有百分之六十各遍傳，起冒感行流且一②時脚樹冬茄倒傳；市共庄地的害動）死小牛甲嗽家大，。（嗽咳

感冒足發病起頭

火皇圖



張、險危（很）野冒感行流③
(的他)因張姓；染傳都家二李
。減無撤度熱日每，炎肺轉子

各遍傳，起冒感行流且一②時脚樹冬茄倒傳；市共庄地的害動）死小牛甲嗽家大，。（嗽咳

好和家大，繳景好脚樹冬茄①半）志代無安平中村；弟兄像（起一）陣做聚相，（事無安。戲遊來

至九十五以上的仔球已腐爛，這是利用仔球生產洋蔥的最大困難。但也有二個解決的方法：①在高冷地春播，在六、七月育成仔球，供平地八、九月栽種，這樣不須經過長久的貯藏期，可以減少仔球的腐爛。②用冷藏法保藏；溫度在攝氏零度左右最好。據實驗，仔球在收穫後第一個月內，很少腐爛和發芽，所以仔球收穫後，可先在室溫貯藏一個月，然後放入冷藏庫貯藏，這樣可節省貯藏的費用。

四、栽植適期和仔球的大小

仔球栽植時期，為新曆八月中旬至九月上旬。早栽植，不但可減短仔球貯藏時間，減少仔球腐爛，而且可提早收穫時期。栽植前，應先按仔球大小分組；仔球橫徑四公分以上（大概重量在一臺兩以上）的，可算大仔球，橫徑三公分以下的為小仔球，在前二者中間的為中仔球。仔球分組後分別栽植，以便管理。用大仔球栽植，雖分球較多，形狀不良，但生育較強，能抵抗不良環境，不易枯死，且能提早生產，產量較高，利益還是較大。如用小仔球栽植，情形恰好相反。早玉品種不會抽苔，所以用早玉仔球栽植時，應選大仔球早植。田間整理和作畦方法，和普通用綠苗栽植時一樣。四尺寬的畦面栽四行，一尺二寸寬的畦面栽二行，

株間用小仔球時為五臺寸，用大仔球時為六臺寸。仔球栽植深度，以仔球全部蓋入土壤為最好。栽植後的管理方法，和普通栽培法相同。

使用仔球的目的，在趕早市，所以不必等葱球充分肥大就可以開始收穫。用仔球栽出的葱球多分球（仔球愈大分球愈多），所以形狀較為不良，但在缺貨時期，市場上重量不重質，銷路還是很好。

水田施用尿素的要訣

李 珊 淸

尿素肥效比硫酸銨長，但剛施下時，很容易流失，所以使用尿素時，必須注意下列幾點，才能充分發揮肥效：

①水田於排水後，以尿素行全層施肥，約在施肥後三四日才可灌水，日數多少要看土壤性質和溫度而定；在攝氏三十度時，施用尿素於砂壤土，壤土或粘土，只要經過兩天就能灌水。在寒冷氣候下，常需七、八日後，才可灌水。


②施用尿素肥料後，土壤也不可過分乾燥，如於施用尿素基肥後，長期不加灌水，肥效也要減損。所以，除遇寒冷天氣以外，施用尿素後，田面缺水期間，不宜超過五天。

③尿素用作追肥時，應分次施用，每次用量不要太多；尤其是在滲透性大的砂質土壤上使用尿素時，更須注意。

④砂質土壤上面施用尿素前，如田面過乾，應先微微灌水，使土壤濕潤，然後分次施用尿素。

⑤在保水力強的粘土水田，尿素不可施得太深，以免淋失。施用前，田間先灌淺水，堵好水口，全面撒施尿素，隨即除草，使土壤與肥料充分混和，經過四、五日再行灌水。

農友們絕不要看葉子的顏色沒有變化而超過規定量施用尿素；過量追施肥料，是反而會減產的。



蔗樣怎伊問，教請來李姓張姓⑥
喚伊勸士護；（能賢等何）賢尼
頭起病衆是冒感，哭免

真驗經症各，士護女位一蔡姓⑤
染是但，厝蔡傳冒感然雖；富豐
。（久不）久外無着

烏就命生天三，救無是重沉炎肺④
好安平家一，友朋好蔡姓壁隔；有
。（好很）溜溜