


預防你的乳豬發生

乳豬貧血症

劉榮標




貧血症對於乳豬常引起很大的損失。但知道的人，實在很少，常誤認爲其他疾病。

貧血症，主要發生在水泥或磚地上生長的乳豬。很多農家，沒有泥地的運動場供豬運動，也不把母豬放出屋外，整年養在屋內水泥或磚地上，繁殖下來的乳豬，和泥土接觸的機會很少，結果就發生貧血病。

要使乳豬生長得好，除供給充分的蛋白質，脂肪，碳水化合物，維生素等外，還須供給微少數量的鐵物質，如果不供給鐵物質，乳豬就會貧血，生長不良。乳豬在生長過程中，這些鐵物質一部份可以由母乳供給，其餘由外界，如從泥土中，攝取來補充。

母豬貧血，症狀不明顯。

乳豬缺乏鐵物質，出生後一到三星期內就發病。初期病豬，外觀上仍肥滿，但是沒有力氣，不喜歡運動，精神萎頓，喘息，但並不發熱。到發病後期，皮膚發生繩紋，粘膜與皮膚呈蒼白色。這時，病豬生長抑制，體重減輕，逐漸消瘦，同時，貧血豬對疾病抵抗力減退，容易併發肺炎，病症更惡化時，呼



猪小健健：圖下，猪小血貧：圖上

飼養在水泥或磚地上的乳豬，因為缺少礦物質，常會發生貧血症。這種病的初期，症狀不顯著，後來由於抵抗力減低，容易併發肺炎，以致突然死亡。

吸困難，咳嗽，突然死亡。貧血症全年都有發生，但在冬季常常因併發肺炎，死亡率特別高。

乳豬貧血症的防治就是要供給鐵物質。在豬舍設泥土的運動場，或在豬舍內的一角放泥土，使豬隻從泥土中攝取鐵物質，就可預防貧血症發生。已經飼養過豬隻的舊土，可能有豬蛔蟲卵的污染，所以泥土宜採用未會飼養豬隻的清潔土。每日在母豬的飼料中，混入微量的鐵物質也可預防乳豬的貧血症。臺灣大學畜牧獸醫學系配有一「猪安寧命」，加在飼料中餵猪，可以供給鐵物質，防治貧血症。

開錢補運輸大豬



火西圖文

，（罪犯）志代犯欺詐當時③半，（年幾好）年若幾了關次一錢騙來命算學就，去塊無贏出仙

，變改無（大長）漢大仙半②去提祿衫錢無，騙欺來巧取門專連流去（寮妓）間花錢有，典。（逛逛

，仙半李有出（名地）脚柑①皮頑）賤正真（時草飽鳥食一，（事做不）天天捉兼愛最，（

# 甘蔗宿根矮化病的防治容易傳染病化千方

甘蔗的宿根矮化病，在外表上，沒有什麼顯著徵狀。但是剖開病蔗莖

檢查，在節部橫斷面，可以看到若干維管束變成橘紅色或紅色，就是蔗莖斷面的紅點，這是它的一個病徵。

紅點越多，病情就越嚴重。紅點很少延伸到節間，所以剖開蔗莖時，位置要正確。太上或太下，都可能看不到。

這種紅點在近根部的數節中，比較容易發現。有些品種，發現。有些品種，

十個蔗苗。所以一蔗園中，有幾株病蔗，可以在二、三年內，使全部蔗園甘蔗受害。

## 二、溫水處理蔗苗

溫水浸種，是防治宿根矮化病的最有效方法。把蔗苗，在攝氏五十度的溫水中，浸漬二小時，可以大大減少矮化病，對甘蔗發芽，也沒有什麼妨礙。

甘蔗採苗後，分成上中下三部。上部的嫩苗，單用谷藥生消毒，下部的老苗，如果有時間，可用溫水浸或石灰水浸，作普通原料蔗園用苗。中部健苗用溫水浸種後，作為苗圃繁殖。

溫水浸種，要特別注意水的溫度，一定要嚴密地保持在攝氏五十度。要浸種的蔗苗，不要剝去葉鞘，以免損傷蔗芽。

溫水處理過的蔗苗，取出了以後，就要攤開，發散溫度，絕不可堆置過夜。苗的兩端切口，再浸一浸谷藥生液，消毒一次。溫水浸過，消毒完畢的蔗苗，可以放置二、三天才種植。現在各地糖廠，都有溫水浸種的設備。各地蔗友，可向附近糖廠接洽，代為浸種消毒。

此外，還要注意蔗刀的消毒。切苗用的刀，每次用過之後，放進酒精裡，取出再用火燒，可以防止本病的傳染。

## 一、病源傳播的媒介

(請參看本刊五卷十二期第七頁「甘蔗宿根矮化病」)

患有宿根矮化病的甘蔗蔗汁，可以傳染這個病。病蔗蔗汁在室溫下貯藏五天，或用水沖淡到一萬倍，仍有傳染的能力。

砍甘蔗的刀，是病源傳播的媒介。例如切苗刀，切了一株病株後，就可以接連影響到六

莖肉變成乳黃色。

感染的病株，莖數較少，莖長較短，蔗徑較細，乾旱的時候，葉尖枯萎，並沿葉緣枯焦，生育不良，產量大為降低。



斷部帶莖病點紅的面



煦百八十一，寸分無在實運補⑥  
亂子（愛）痛治招（較計不）論冤。  
亂子（愛）痛治招（較計不）論冤。  
運補來物賣衫當，紛紛

共切親待招，吻吻笑見着仙半⑤  
應）趙講，論子甲卦卜籤抽，順溫。  
運補來大大（該

患）破常常，子生獨個一治招④  
請，定注天命呆是講，捕肚腹病（  
。命算來仙牛數

## 蔗苗和蔗苗圃的智識

拂塵



蔗苗上的病菌，尤其對於甘蔗的鳳梨病有特效。谷樂生液目前都用〇·一%至〇·二%的濃度。

選用優良蔗苗，是甘蔗栽培的首要工作。優良蔗苗，應具備如下的條件：①節間長，②直徑粗，③不過熟，④沒有病蟲害。由宿根蔗採苗時，採苗前必須檢查，要從沒有病蟲的蔗株採苗。

蔗苗如不立刻種植，應覆蓋草蓆，避免烈日曝曬。蔗苗在搬運時，應注意不要受傷。

①溫水浸種：蔗苗經溫水浸漬，不但可以防除病蟲，並且可以促進發芽。例如對於枯條病，可以用攝氏五十二度溫水，浸種二十分鐘防治，同時對於防除粉介殼蟲也很有效。

②飽和石灰水浸種：蔗苗種植前，先用石

灰水來浸漬一天，可使蔗苗發芽整齊。石灰水最適宜的濃度是二·五%，浸漬的時間為二十四小時，但時間略短也可以。如恐石灰品質不良或雜質過多的時候，可用一%至一·五%的濃度，較為安全。這種飽和石灰水調製一次以後，可以連續浸漬蔗苗七次左右，仍然有效。

③藥劑消毒：可由蔗苗傳染的病害，如葉鞘赤斑病等，可以用谷樂生液消毒，來殺滅附在

盛裝蔗苗，全部浸入木桶的藥液中，約經卅秒至一分鐘左右，提出竹籬，斜放在木桶邊緣上，使藥液瀝入桶內，就可送至圃場種植。蔗苗還可以用一·五%飽和石灰水，加萬分之一谷樂生，配成混合液，處理二十四小時，既可殺菌，又不發生藥害，並能促進發芽，刺激植株生育。

春植苗圃單位面積的採苗量，和植秋苗圃的採苗量大略相同。為節省勞力時間，在肥沃有灌溉地區的苗圃，如栽植得法，可以改行春植，但時間不可過晚；清明以後最好不要種植，以免蔗苗產量減少。

甘蔗苗圃，要選擇肥沃而灌溉方便的地方

。整地時，應在甘蔗植溝內撒佈BHC，以防地下害蟲。為增加分蘖莖數，採蔗苗的甘蔗可採用密植方法，並增施氮肥。

栽植後，要按時灌溉，並應定期巡視田間

，發現病蟲害時，應立即防治。

秋植甘蔗最好行中培土（不高過地面八吋）施肥適期，在春植苗圃以三期（六月上旬、六月下旬、七月中旬）等量施用，較為理想。



(的她)因，錢許小用所院病⑨  
，趕天無人害仙牛，院出便好醫子  
。猪大慧蓮補錢(花)開



入子送緊趕，意主有時一治招⑧  
才)免者，治醫緊生醫過經，去院  
。時了誤症過(免



補，重沉病子(的她)因治招⑦  
仙牛，(法辦是不)工彩無正真運  
。望無命治聚無若，人列售在實