

名品種	特 性	特 徵	適 合 地 區
青島	早熟性(約一二日) ○日, 籽粒對 莢果重比率稍低 (六五—六八%)	立性小粒種(西 班牙型)莢果稍 深, 果實, 形狀 稍深, 種實, 形狀 為長橢圓形, 每 皮淡紅粒二粒, 種 皮淡紅粒二粒, 種	本省東及北 部。
P-49 B-146	早熟性(約一二日) ○日, 籽粒對 莢果重比率稍低 (六五—六八%)	立性小粒種(西 班牙型)莢果稍 深, 果實, 形狀 似狀與青島種類 相似, 種實, 形狀 似圓形, 每皮淡 紅粒二粒, 種皮淡	臺北、臺南 東。
龍潭 油豆	早熟性(約一二日) ○日, 籽粒對 莢果重比率高(六 八—七二%)	立性小粒種(西 班牙型)莢果小 而圓, 殼極薄, 種 皮淡紅粒二粒, 種	臺南區。

(上接第十頁「茶樹的剪枝」)

十餘年不等。品種以黃柑系及青心系為最多。這種茶樹，生長期中，曾臺刈二、三次，採摘過度。這種茶樹雖呈衰弱，每年仍有茶芽可採，生產量相差不大，如龍潭鄉一帶的黃柑茶區，年產鮮葉二千餘斤，但中標後察一帶的產量還不到五百公斤。這種茶區，必須先多種綠肥，多施堆肥等有機質肥料及鉀肥後，離地面二十至三十公分深剪枝，才能收到更新的效果。

⑤ 只能新植更新的老茶園 在桃園八德鄉，臺北林口鄉等，可以發現少數接近荒廢的茶園。這種茶樹，很難剪枝更新，最好在老樹行間，新植優良




圖茶老的新更植新能只：志圖

三年內，如果老樹而適合需要的品種。在新植二、還有生產時，可繼續採摘，等到第四或第五年，幼樹開始生產時，剷除老樹。如果老樹萌芽力已十分微弱，而且土質也衰瘦，就應立即剷除老樹，重新設計開闢。

(三) 芽樹剪枝應注意的事項

最後把目前臺茶剪枝應注意的要點，歸納於下，以供茶農們參考：

- ① 剪枝時期，以十一月下旬至十二月下旬最適宜。
- ② 剪刀刀口要銳利，剪刀的形狀及大小，如圖15所示的最好，目前本省市面上有一種庭園用的短口剪刀，並不適用於茶樹的剪枝。
- ③ 剪枝要輕快，使剪口平滑，不可使枝條傷裂。
- ④ 使剪口盡可能在主幹分枝上面六至十公分的地方。
- ⑤ 中央主幹及徒長枝，必須在剪枝面下深剪，下部細小弱枝，必須剪除。
- ⑥ 深剪後第一次採摘，絕不可早採，只可摘心。
- ⑦ 深剪的前後一年，應加倍施用鉀質肥料。
- ⑧ 茶樹直立性，茶園海拔較低，氣候暖和，土質肥沃



茶樹灌木性，伸育緩慢，茶園海拔高，氣候寒冷，土質貧瘦時，剪枝應較淺，剪枝週期可稍長。

⑨ 「施肥」，「採摘」與「剪枝」。三項作業，有密切的關係。肥後茶樹生長強旺迅速必須舉行適當的剪枝，才能促進側枝的發生，擴大樹冠採摘的面積，增加採摘面上萌芽的密度與速度，剪枝後開始一、二次的採摘，更要注意擴大採摘面與均勻側枝分佈的養成，絕不可早採與採摘過度。

(全文完)

◎日本美國等優良種子已入荷!!

- ◎長岡交配一號甘藍
- ◎純莖葉三池中生甘藍
- ◎三年子サクセツクシヨン甘藍
- ◎極早生獻上花椰菜
- ◎美國早中生兼用花椰菜
- ◎京都三號結球白菜
- ◎丸莖山東菜
- ◎金澤粗蘭結頭菜
- ◎美國大型結頭菜
- ◎美國大型五寸人參
- ◎美國紅心五寸人參
- ◎美國嫩莖苜蓿
- ◎夏播豐碩節成胡瓜
- ◎木白莖山東菜

◎最新安全強力殺蟲劑
馬拉松乳劑 (マイラソン) 地亞淨濃乳劑 (ダイアジン)

◎日本原裝

正日產トマトン等植物補爾檬均有
◎其他各項優良種子優秀農藥農具均有詳細請閱目錄「目錄附郵票一元函索即寄」

臺北市迪化街一段八六號

輸入元 臺灣農產企業公司

直賣部 臺灣農業資材公司

郵政劃撥儲金(農產) 一八九五三
農業資材 一二七九九
電話：四四二五三 四二三六五