



栽培有利的甜椒

郁宗雄

鮮美可口。八月起，全省各地可開始播種，有興趣的農友可以適時種植。

一、兩種優良的品種

①路畔金 (Ruby King)：路畔金株型直立，強健早生，豐產。果向下垂，充分長大時，長十二公分，寬八公分，重一八〇公分。青椒鮮綠，有光澤，肉質稍薄，無辣味。成熟時變紅色，適於家庭用和市場用栽培。如要趕早市出售，以本品種為有利。市場上販賣的青甜椒，就是這個品種。

②加州王 (California Wonder)：株形較為開展，較晚生，初果向上(朝天)生長。果梗粗短。大果長十公分，寬八公分。因肉質特別厚，雖果形比路畔金較小，但重量較重，一果重量可達二五〇公分。果面平滑，少光澤。肉質脆爽，比路畔金好。但果皮堅硬，是缺點。貯藏力較強，適於家庭及輸出用栽培，也適於市場用栽培。臺北市農產企業公司和興農種子行有發售普通栽培用的種子。鳳

甜椒栽培容易，病蟲害少，產量多，收穫期長，市價又好，是很利於農作的。

本省農友，還有許多沒有吃慣甜椒的，其實甜椒的營養豐富，味道也

山熱帶園藝試驗分所也有少量原種推廣，如農友需要採種繁殖時，附郵票一元即寄種子一小袋。

二、適宜的土地

要種甜椒，應選數年沒有栽過茄子、番茄、菸草、馬鈴薯等茄科植物的土地。一般耕地，都可利用，但以向陽，土層深厚，肥沃的壤土最為適宜。雨季栽培，應選地勢較高，雨水容易排出田外的砂質壤土為宜。

甜椒比較不耐水濕，也不十分耐熱。如果生長期雨水多時，生長衰萎，不易結果，引起落葉，甚至根部腐爛枯死。七、八月溫度過高時，結果不良。一、二月溫度過低時，生育也不會旺盛。北部夏季高溫，冬季多濕，所以生長不如中南部的理想。


三、播種適期

北部的播種適期為八月至十月及三月至四月。在中南部為八月中旬至三月，隨時適於播種，而以九月至十月為最適期。各地早播可提早應市，市價較高，但遭遇暴風雨危險性也較多。

十二月播種時，定植後氣溫偏低，生育不盛，收穫期遲緩。在二、三月播種，生長後期遇高溫多雨，產量較少，果形也較小，但應晚市需要，售價較高。

四、育成壯健的苗

播種用苗床，栽十公畝地，約要新種子四十公分。苗床床面面積，條播時十八平方公尺(行距九公分，粒距三至四公分)，撒播時二十五平方公尺



本圃土地深耕，整地作高畦。十公畝地基肥用量：堆肥二、〇〇〇公斤，草木灰一二〇公斤，過磷酸鈣三十公斤，條溝施或撒施。畦向南北走，以免果實發生日燒病。畦幅一三〇公分(連畦溝)為標準。一畦上栽二行，株距四十五公分為準，十公畝栽三、三〇〇株。但在三至四月晚栽的，生育不能繁茂，株距四十公分便够，這樣且可使初收期收量增加。

五、整地定植

發芽後，適度間拔；條播的，株距六公分為準，撒播的，六至七公分四方一株，使育成壯健苗。育苗期間，秋播約三十天，冬播約五十天。本圃有六至七片開展，苗高十二至十五公分時，為定植適期。如果本圃土壤條件適宜，寧可稍早定植為有利。

(上) 加州王果型注意，果意較厚。
(下) 路畔金果型注意，果意較長。
本圃土壤半乾濕時，栽植既方便，栽植後容易發根活着。栽植時，宜選陰天或下午太陽斜西後，選壯健苗帶土掘起，盡量保留宿土，按距每穴栽一株。

六、移植後的肥培管理

移植後注意灌水，勿使乾旱。土壤乾燥時，引起落花落果，果形較少，果皮硬化等不良現象，這在高溫期更厲害。雨天注意排水，勿使畦溝內有積水。生育初期，施行適度的中耕除草，培土。除草工作，應在施用追肥前施行。甜椒植株易倒伏，且莖枝脆弱易斷，待分株後，應插立一尺左右的短支柱，扶持植株，加以保護。甜椒分株性不強，所以不行整株摘芽。結果後，畦面最好敷草，以防植株倒伏時，果實接觸地面而腐爛。畦面敷草，在高溫多雨期，還有防止土壤沖刺，和防止土溫過高的功用。

甜椒生長期很長，如果肥料施用足夠，管理適當，可長期的採收。追肥主要用人畜糞尿。定植活著後，和初果期的追肥很重要。此外，依照生育情形，大約每隔半個月施用一次，直至廢耕為止。

甜椒抗病性較強，並無嚴重病害，只有白粉病在低溫期發生較多。葉背面生白粉，綠色葉漸次褪成，變黃脫落，可用硫黃水（加水一〇〇倍）或「大生」七十八（加水四〇〇倍）噴射，注意葉背噴射周到。蟲害有蚜蟲，可用魚藤精乳劑防治，夜盜蟲可用DDT或BHC防治。

七、適時採收

甜椒品質，在果實尚未充分長大，仍為青色時最好。如果果實已呈紅色才採收，不但減殺樹勢，影響後期收量，並且肉質也不脆爽，

皮部變硬。反之，如果收穫太早，不但收量少，且肉質也不佳。甜椒一作採收期很長，如中南部九月初播種，十月初栽植，十一月中旬起採收，如果施肥管理適當，一直可收至第二年雨季來臨，植株萎萎為止。所以，越早播種，收穫期越長，收量也越多。但是，初收期果形較大，肉質較厚，後期果果形較小，肉質較薄。後期果太少而太小時，就可以廢耕。當甜椒施肥不均及不足，或果實過熟時採收（採種用），會使發生過期性結果現象，結果一時多一時少，總產量就減少。

甜椒植株脆弱易斷，採果技術不佳時，容易折斷株條。採果最好用剪刀剪下。如用手時，一手握住果實着生處株條，一手握住果梗基部，輕輕一折，果實就可採下。

果實在室內放置時間，高溫期四日內，低溫期七日內，仍有商品價值。但果實太嫩時，不耐貯藏。如接近成熟時採收，貯藏期果色變青紅。

你知道麼？



美國西部巨大松的種子，落地後發芽。一棵巨大松，可活四千年，樹高達七十五公尺，樹圍三千

好人甘會雷打死



姓張名老清人，江清名老張姓①
面平公正，名聲香大，家好。人好張伊稱

日一江清就開嘴，叫農子會
去領肥，加治（己自）落田巡
水忽鳥一雲大堆。

時一雷陳（响）雨滴水，媳
婦緊來勒伊。好人會那打雷死
？若會打無天理。

火皇文
壬西圖