



分公十三里八十步

好得種樣怎 稻菜蓬

昌瑞林 科產櫟廳林麓




蓬萊稻在產量和品質方面，都比在來稻好。有的農友認為蓬萊稻不如在來稻，可能是因爲他們的栽培、管理等方法不適當，以致成績不好。現在提出蓬萊稻的優良品種，並介紹蓬萊稻的標準栽培法如下，以供農友們栽培時參考應用。




四、施肥的標準：每公頃水稻三要素的標準施用量如上圖。各位農友可參考自己田地肥瘠酌量增減。

九、○○○○公斤以
上堆肥 全部堆肥
，磷肥，鉀肥，和
三分之二的氮肥，
應在第二次犁耕前
撒佈田面，犁入土
內，做為基肥。剩
餘三分之一的氮肥
，在第一、二次中
耕除草時，各分半
當追肥施用。追肥
施用前，應排出田
水，才能提高肥效。



二中八復：雄，五。八，南臺，號臺，號五號五一北稽
號一號四臺二高號高號嘉區中臺，中臺，○。號七一種
五，○。中七雄，雄，南：一臺區中臺號新，七二：一
臺一六號二高區嘉二臺六一中：一中，竹光號七臺
南號東號五。二雄：南號中二五一臺五一臺區後，號北優
八，區，號花號臺，六號三五五中五五中：一中，竹光號七臺
號嘉：嘉，蓮，○中四嘉五。號○六號三六新
區南陽高號六號南陽號五，五號五竹
區南陽高號六號南陽號五，五號五竹



五、本田的灌溉與排水：




二、請向採種更新農戶交換良種
新穎的耕種，發芽率高，生育旺盛，盛產，出穗整齊，稻谷單位面積產量高，稻米品質好，所以稱稱每種稻三期。以後，照向採種田農戶更新一次。


應經常保持三寸深的水。水稻開花後，灌溉水須逐漸減少。黃熟期後，田水就要完全排乾。



九、澈底撲滅三化螟蟲：
 ①採取卵塊。②捕殺成蛾。③用一份安特靈，加五份水，用木棒攪拌，在螟蛾發生最盛期，超十天內，噴射到稻株的中、上部分。安特靈有④富粒多，P.M.二星半濃度，加二份水，用木棒攪拌，着誘蛾燈，誘蛾發至兩星期後，噴射在稻株的下部。使用時應帶面具有，特別小心。




十、其他害蟲：稻飛蝨，浮塵子，鐵甲蟲，黑椿象，負泥蟲，和捲葉蟲的防治法如下：
 ①採取卵塊。②捕殺幼蟲，成蟲。③稻飛蝨用一·五%浮塵子用一·五%亞淨濃液或B.H.C.粉噴射。④黑椿象用噴射。⑤鐵甲蟲，負泥蟲用D.D.T.粉二十五%溶液或一%安特靈粉噴射。



十一、適期收刈最為有利：水稻最好在全穗變金黃色，只稻穗基部留有二、三青稻粒時收刈。這個時間，大約在抽穗（指全穗抽出三分之一）後三十五天。脫谷的稻谷，應做成長南北向波形長條晒乾。
 「蓬萊稻標準栽培法淺說」，該項小冊係農林廳及農復會合編，不日即可刊印單行本」。



六、中耕除草：絕不可省！
 耕期作除草，最好第一期在草石中插三次，第二期在草石中插一次，第三期在草石中插一次，第四期在草石中插一次，第五期在草石中插一次，第六期在草石中插一次，第七期在草石中插一次，第八期在草石中插一次，第九期在草石中插一次，第十期在草石中插一次，第十一期在草石中插一次，第十二期在草石中插一次，第十三期在草石中插一次，第十四期在草石中插一次，第十五期在草石中插一次，第十六期在草石中插一次，第十七期在草石中插一次，第十八期在草石中插一次，第十九期在草石中插一次，第二十期在草石中插一次，第二十一期在草石中插一次，第二十二期在草石中插一次，第二十三期在草石中插一次，第二十四期在草石中插一次，第二十五期在草石中插一次，第二十六期在草石中插一次，第二十七期在草石中插一次，第二十八期在草石中插一次，第二十九期在草石中插一次，第三十期在草石中插一次，第三十一期在草石中插一次，第三十二期在草石中插一次，第三十三期在草石中插一次，第三十四期在草石中插一次，第三十五期在草石中插一次，第三十六期在草石中插一次，第三十七期在草石中插一次，第三十八期在草石中插一次，第三十九期在草石中插一次，第四十期在草石中插一次，第四十一期在草石中插一次，第四十二期在草石中插一次，第四十三期在草石中插一次，第四十四期在草石中插一次，第四十五期在草石中插一次，第四十六期在草石中插一次，第四十七期在草石中插一次，第四十八期在草石中插一次，第四十九期在草石中插一次，第五十期在草石中插一次，第五十一期在草石中插一次，第五十二期在草石中插一次，第五十三期在草石中插一次，第五十四期在草石中插一次，第五十五期在草石中插一次，第五十六期在草石中插一次，第五十七期在草石中插一次，第五十八期在草石中插一次，第五十九期在草石中插一次，第六十期在草石中插一次，第六十一期在草石中插一次，第六十二期在草石中插一次，第六十三期在草石中插一次，第六十四期在草石中插一次，第六十五期在草石中插一次，第六十六期在草石中插一次，第六十七期在草石中插一次，第六十八期在草石中插一次，第六十九期在草石中插一次，第七十期在草石中插一次，第七十一期在草石中插一次，第七十二期在草石中插一次，第七十三期在草石中插一次，第七十四期在草石中插一次，第七十五期在草石中插一次，第七十六期在草石中插一次，第七十七期在草石中插一次，第七十八期在草石中插一次，第七十九期在草石中插一次，第八十期在草石中插一次，第八十一期在草石中插一次，第八十二期在草石中插一次，第八十三期在草石中插一次，第八十四期在草石中插一次，第八十五期在草石中插一次，第八十六期在草石中插一次，第八十七期在草石中插一次，第八十八期在草石中插一次，第八十九期在草石中插一次，第九十期在草石中插一次，第九十一期在草石中插一次，第九十二期在草石中插一次，第九十三期在草石中插一次，第九十四期在草石中插一次，第九十五期在草石中插一次，第九十六期在草石中插一次，第九十七期在草石中插一次，第九十八期在草石中插一次，第九十九期在草石中插一次，第一百期在草石中插一次。



七、稻熱病怎樣防治：
 ①選種抗病性品種，如臺中一五號，嘉南二號，新竹五〇號，高雄二七號，光復四〇一號。②氮肥用量不可過多。③清潔衛生，無病的秧苗選播植。④田面不可過度乾燥。⑤不要用冷水灌溉。⑥發病時，噴射谷仁樂生一千倍溶液或西樂生一千倍溶液或西樂生石灰，使用量請看本刊六十六期。



八、紋枯病，小黑核病，和胡麻葉枯病的防治方法：
 ①氮肥用量不可過多。②谷仁樂生消滅病的稻草燒燬。③清除田畔雜草。以防病害蔓延。④集中有病的稻草燒燬。⑤發生紋枯病，小黑菌核病時，噴射四斗式波爾多液。⑥發生胡麻葉枯病時，噴射六斗式波爾多液。