

，最為有利。嫩莖高莖不可連栽，日照須充足。

選大苗（不是老苗）栽植。帶上掘苗，儘量保留宿土。行距至少五十公分，株距至少三十公分，株行距太小，嫩莖高莖就長不大。栽植工作應精細，栽後應立即灌水。

四、多施堆肥，避免忽乾忽濕

本田也應多施腐熟堆肥作基肥；如不用堆肥，土壤緊實，嫩莖不能十分肥大。追肥多用氮肥，可以硫酸銨或豬糞尿為主。施肥不可短少。

生長期不可缺水，須經常保持半乾濕狀態。如土壤忽乾忽濕，容易引起裂莖，甚至腐爛，減損商品價值。生長初期要淺中耕，只要鋤鬆土面就可以。生長後期，不可再鋤動土面。如栽培目的專在採收嫩莖，生育期中絕不可剝取下部葉子供食，如果剝取下部葉子供食，就會阻碍嫩莖的發育。

五、施用硼素預防莖部腐爛

嫩莖高莖在各地栽培，常發生硼素缺乏症而使莖部腐爛，尤其在少用有機質肥料時，腐爛較多。缺硼時，生長初期並無異狀。以後發病時，先在接近地面的莖中心發生水漬狀症狀。嫩葉主脈及葉緣生長衰緩，葉面皺縮，葉緣反卷，葉色濃淡不勻。上半葉葉邊先發現褐色小斑點，葉尖開始焦枯，漸次延向下邊葉緣。頂芽生長稍受阻抑，發生多數分枝。莖內部漸變淡褐色，濕性軟腐成空洞。最後在種子成熟期，莖部折倒潰死，不易採到種子。缺硼嚴重時，在未抽苔開花前就腐死。只要到西藥房裡買幾塊錢硼砂（大約十元一公斤），作為肥料施用，就可以防治這

種病症發生。硼砂施用量，最好參考第一年缺

硼程度來決定。如發生缺硼症時，大概一公畝地施用硼砂○一至○二公斤（三至四臺兩）已足夠。施用方法：把一半硼砂作基肥施用，稀釋後，洒在葉面和畦面就可以。硼砂施用量

不可過多，並應均勻施下。如施肥過多，或施用不均勻，對於不耐硼素的後作有害。（未完
、下期續）


◎日本美國等優良種子已入荷！

- ◎長岡交配一號甘藍
- ◎純黃葉三池中生甘藍
- ◎三年子サクセックンショヨン甘藍
- ◎極早生獻上花椰菜
- ◎美國早中生兼用花椰菜
- ◎京都三號結球白菜
- ◎金澤粗蘭結頭菜
- ◎美國大型五寸人參
- ◎美國紅心五寸人參
- ◎美國嫩莖高莖
- ◎夏播豐豐節成胡瓜
- ◎丸葉山東菜
- ◎本白莖山東菜
- ◎洋蔥栽培上必須要的特効藥
- ①種子消毒用ルペロン錠劑
- ②各種病害特効築ルペロン乳劑
- ③最新安全強力殺蟲劑
- 馬拉松乳劑 地亞淨潔乳劑

正日產トマト等植物補爾檬均有
◎其他各項優良種子優秀農藥農具均有詳細請閱
目錄「目錄附郵票一元函索即寄」

臺北市迪化街一段八六號

郵政劃撥全金（農業資材）
一九七九年三



仔叟險危人大，時過已院病到魁⑥
着看家大，兒孩男個一了死，死
。（惜可）四寫無

入去緊趕伊勸，意主出時一菊阿⑤
院入緊趕，死會就院入無若，院
。遲必莫

是但，害厲真（得痛）甲痛蘭阿④
喚請法無婆產，來落（不）喚仔嬰
不）代呆真着想菊阿，知（不）
。（妙