

梅毒真可怕！

性病防治中心

梅毒是最可怕的一種傳染病，可靠的發現方法，就是驗血。

為了防止小產、早產、死產或生下先天性梅毒嬰兒，孕婦的早期驗血檢查和治療是非常重要的。

每四戶有一個梅毒病人

大家厭惡惡癩病(即癩瘋)


病)，主張強制收容癩病患者。但本省癩病患者，估計不過只有八千多人而已。

結核病也

是大家認為最可怕的傳染病的一種，但本省結核病患者並沒有患梅毒的人多，據估計約有十六萬多人。

本省患有梅毒的人，經世界衛生組織和本省衛生當局的調查，估計可能有四十萬人，約合總人口二十分之一。這就是說二十個人中就有一人患梅毒。當然隨着職業和地區的不同，其比率亦有差異。

根據近年來本省推行性病防治工作所得的結果，證明上



述的估計是合理的，或許還要高些。每四戶便有一個梅毒病人，這實在使人，這實在使人我們驚懼！所以梅毒比癩瘋的病更可怕，更普遍多了。

梅毒是這樣傳染來的

梅毒的傳染主要是靠性的行為，由女人傳給男人，或由男人傳給女人。有些人以為在外面偶而玩一兩次是沒有關係的，要知道梅毒是潛伏的，大部的患者，在最初的兩年中，沒有明顯的症狀，但在這初感的兩年內，傳染力極強，凡與患者有性行為時，都可能傳染到的，這是不能



每四戶中有一個人患梅毒

傳染到的。

梅毒的症狀

梅毒在感染以後，往往要經過幾年才發作。早期梅毒患者，每每不以爲病，病徵是吸吸困難，胸悶，身上有紅點疲倦或不明的神經錯亂，以後慢慢侵襲到口、鼻、眼、耳等粘

膜等部分，使皮膚潰爛生瘡以外，最嚴重的可能引起心臟血管系梅毒，和腦髓、脊髓及神經梅毒，使患者癱瘓或風顛以及殘廢，經過若干時間死亡。

梅毒遺害下一代

婦女結婚

後，若傳染到梅毒，如能生育，不是常常小產，死產的現象。(據統計，婦人患梅毒的，懷孕十胎中可能有八胎不會成功。

就是生有先天的梅毒嬰兒，往往數月後即死。病狀

不注意的。其他如接吻，及接觸生病部位也會被

經微的，日後內臟及神系統受害而癱瘓或成一低能兒。

梅毒的預防方法

第一、不要和配偶(夫妻)

以外的發生性的關係。或使安全的保險套(サツク)，並於事後用肥皂與水洗滌局部。

第二、發現梅毒最可靠的方法，便是驗血。遇有感染機會後，一個月內要驗血液。萬一染了梅毒，應即接受治療，到全癒爲止。現在因爲抗生素的發現，梅毒在兩星期內就可治癒了，所以當你發現有梅毒時，是能早期治癒的。

第三、不要把梅毒傳染給配偶，如已傳染，應使其同時治療。

趕緊到衛生所去檢查



嬰兒應吃的果汁和菜湯

無無論母親自己喂乳或用人工喂乳的嬰兒，果汁或菜湯是嬰兒必須加添的副食品，因爲嬰兒所吃的乳中缺少丙種維他命，而果汁與菜湯是富於這種維他命的，所以嬰兒吃了可以防止壞血病。

嬰兒在出生一個月以後，就可以開始加添水果與菜湯了。起初用半茶匙的果汁或菜湯，加等量的冷開水喂給嬰兒，喂時最好是在兩次喂乳的中間。喂的份量可以漸漸加增

，等嬰兒六個月後可飲二至三茶匙，到一歲時就可飲六茶匙(即兩湯匙)。果汁是以橙(雪柑)柚及番茄汁最爲理想，鳳梨和西瓜汁也是嬰兒愛吃的，如果太酸可以加一點糖。菜湯以白菜，菠菜或其他菜類，洗淨切碎放入水中，一開就可以了，加一點鹽，吃時要瀝去渣滓而只用湯。等嬰兒稍爲長大時，普通油少的蔬菜湯就可以用了。

