

土壤肥料

稻作



在陰濕處或堆肥中。（省農業試驗所曾懋鼎）

製造堆肥可以利用麥稈麼？

問：麥稈製成的堆肥會使土質變酸，這是否事實？（臺中縣龍井鄉王茂松）

答：麥稈的氮素含量為千分之四，磷酸含量千分之一，鉀素含量為千分之六。麥稈可以作為製造堆肥的原料，但比較難於腐爛，所以製造堆肥時須注意加水和人畜糞尿。

至於所製成的堆肥對土壤是沒有什麼不良反應。（曾懋鼎）

關於美國矮種高粱

問：①現在本省所推廣的美國矮種高粱有幾個品種？特性怎樣？

②這種高粱從播種到收穫需要多少天？收量怎樣？

國矮種高粱是否適合種植？可以做秋冬浸，對於生長很有阻碍，當然會影響收量。

應該按照下列辦法處理：

①受水浸的稻葉表面如附有泥粉，應趕快洗滌潔淨，使它能充分照到陽光，迅速恢復生長。

②立刻用尿素在葉面施肥，其他要素的肥料無需再施。每十公頃地（一分）用尿素五公斤半加水一百八十公斤，用噴霧器充份噴撒。（臺中縣農林改良場余慶東何火樹）

腐爛的洋蔥頭

問：腐爛的洋蔥頭（洋蔥）是否可以做堆肥？含有什麼成份？用什麼方法可以使它加速腐爛？（雲林縣東勢鄉吳律）

答：腐爛的洋蔥頭可以做堆肥材料，它的成份含有氮素約千分之三，磷酸約千分之一，鉀素約千分之二。全

部腐爛以後，混於其他堆肥中施用，對作物並無損害。要使腐爛迅速，可以搗碎加水放

好。（③適於在砂質壤土栽培。裏作成績並不

品種名稱	生長日數	種類
Westland	約九天	約10天
Farrwhit Martin	約100天	白色
Colby	約九天	約10天
	紅色	

這些品種的高粱在本省的收量據試種結果，春作平均有每公頃二千四百至三千公斤，最高收量有三千九百公斤；秋作平均有每公頃約一千八百公斤，最高收量二千七百公斤。

這兩品種的高粱在本省的收量據試種結果，在整地前施下。化學肥料用硫酸銨、過磷酸鈣和硫酸鉀各二百公斤。混合後三分之一播五至六粒。種子用量條播的每公頃約十二至十三公斤，點播的約九至十公斤。

三、施肥：每公頃用堆肥一萬二千公斤，在第一次追肥後分兩次施肥。第一次在播後二十至三十天間施下，第二次在第一次追肥後兩星期施下。施肥量應該按各地實情而可以酌量增減。

四、種子發芽後間拔兩次：第一次在株高十五公分時拔；第二次在高約二十五公分時拔。點播的每處留一至二株；條播的每

○種子可向當地鄉鎮農會申請。而各農會應計劃集中栽培面積至少二十公頃以上，再向臺中區農林改良場申請爲指定的推廣鄉鎮。以便指導，並避免鳥害。（余慶東何火樹）

○秋冬期優良蔬菜種子

長岡交配一號甘藍、交配白菜、三池中生甘藍、金澤

及美國結頭菜、大型五寸人参、美國晚生大型花椰菜、美濃早生大根、聖護院大根、丸葉山東白菜、落合

胡瓜、富津南瓜等各種蔬菜種子均有

△養豚家用**ビート**已進貨

○正日本原封裝各種補助藥

トマトトーン、トランプラントーン、ルートン、フルートン及24D除草劑均有，請勿誤購僞造貨品

○洋蔥病害特效藥 補米農乳劑

奈加拉（ナガラ）葡萄苗及洋莓苗廉供。

十月末日前預約訂購特打八折半優待

○預約辦法函索即寄

四五年度農藥、農具、種子、花木等目錄附郵票乙元函索即寄

臺北市迪化街一段八六號

輸入元  
臺灣農業資材公司

電話：四四二五三 四二三六五

直賣部  
臺灣農業資材公司

電話：四四二五三 四二三六五

五、收穫：在莖葉變黃而穗實硬固以後就可以收割。把穗剪收曬乾了才脫粒。如果爲採種用，必須一畝只種一個品種，避免雜交變劣。

六、病蟲害：高粱的病害並不嚴重。害蟲有蚜蟲和蚜蟲。粟蟻的幼蟲能鑽入莖裡食害，發現時可用富粒多或PM噴撒。蚜蟲可以用魚藤精乳劑防治。（臺中區農林改良場何火樹）

