

安哥拉毛用山羊



安哥拉毛用山羊，是一種利用羊毛的山羊。它的適應力強，容易飼養，產毛量又多，很適合於山地的飼養。本省在四十三年，由美國引進後，經試驗所飼養，成績很好。

安哥拉山羊怕潮濕，所以，必須選擇地勢高燥，排水良好的地方蓋羊舍。羊舍面積，種母羊一頭，應佔十五至二十平方尺。舍內須光線充足，空氣流通，地面須鋪三合土。羊舍前，應有羊舍面積兩倍大的運動場。

安哥拉山羊，性好動，喜歡吃雜草及灌木樹葉，所以，最好放牧飼養。放牧外，每日約需給二〇〇公分的蛋白質飼料，可按甘藷一〇〇公分，豆餅五十公分，麥麩三十公分，米糠二十公分的比率配合。飲水及食鹽應經常供應。羊蹄約須一、二月修剪一次，修剪至蹄底平整。

安哥拉山羊很少發生疾病。剪毛後，偶然會發生腰麻痺。山羊體重每公升每天吃五十至六十公絲(une)的 Suga corn，連續吃六、七天就會好。如要預防，可在剪毛後，給藥一次，隔十五日，再給藥一次，山羊體重每公升每次給二十至四十公絲，每日分二次給與。大部分內寄生蟲，可用一硫二苯胺(フェノサイアジン)或磺胺瓜錠(スルフアグアニチン)驅除。外寄生蟲可用DDT等殺蟲劑驅除。

安哥拉毛用山羊通常一年繁殖一次。出生後五、六個月的幼羊會發情，但應在出生後十五至十八個月後才配種。每年九、十月間，放公羊於母羊群中，使自行配種。一頭公羊，可配四十五頭母羊。懷妊期間，約為一四五至一五二天，這時期內應特別小心管理。分娩期應停止放牧。應使在分娩室或分娩欄分娩，每胎產仔羊一至三隻，初產多為一隻。仔羊產下後，立即用布拭乾仔羊身體，並幫助它吸乳。第二天，就可放到運動場上運動。一週後，可隨母羊群放牧。約一月後，可給青草。三、四月後，可斷乳；但要留做種用的，應遲一點斷乳。

安哥拉山羊，每年可剪毛二次(三、四月間及九、十月間)。今年生的小羊，在明年春季就可剪毛。剪下的羊毛，如不立即出售，應小心包裝，貯藏在乾燥、通風的地方。公羊一年平均產毛十二·五五三磅，母羊六·四四六磅。(安)

洋菇播種後，四十至五十日，就可以採收。當天出售，或家庭自用的，要選被膜正要破裂的採收(通常在破裂的前一日採收)，這時的香味最好。

要貯藏、運銷和裝罐頭用的，最好在破膜前前三、四日採收。被膜已開，如同傘狀，或菇褶變褐黑色的，就失去食用的價值。

普通都在每日上午採收，但在盛產期，可以早晚採收二次。大菇收後，小菇續生，約可連續採收三個月。

採收時，用手輕輕握著菌體，左右轉動，向上提取，絕不可連帶菌絲採收。

洋菇在適當環境下，每坪地(三·二七平方公尺)產量平均達十八公斤以上。

洋菇採收完了後，搬出全部堆肥，用作種菜的肥料。栽培床要洗刷清潔，再用百分之三的昇汞水，或福爾麻林液(Holmarin)消毒，準備下次培養應用。

(本文取材自胡開仁先生著農復會編印之西洋菌培養法)

安哥拉山羊很少發生疾病。剪毛後，偶然會發生腰麻痺。山羊體重每公升每天吃五十至六十公絲(une)的 Suga corn，連續吃六、七天就會好。如要預防，可在剪毛後，給藥一次，隔十五日，再給藥一次，山羊體重每公升每次給二十至四十公絲，每日分二次給與。大部分內寄生蟲，可用一硫二苯胺(フェノサイアジン)或磺胺瓜錠(スルフアグアニチン)驅除。外寄生蟲可用DDT等殺蟲劑驅除。

洋菇播種後，四十至五十日，就可以採收。當天出售，或家庭自用的，要選被膜正要破裂的採收(通常在破裂的前一日採收)，這時的香味最好。


要貯藏、運銷和裝罐頭用的，最好在破膜前前三、四日採收。被膜已開，如同傘狀，或菇褶變褐黑色的，就失去食用的價值。

普通都在每日上午採收，但在盛產期，可以早晚採收二次。大菇收後，小菇續生，約可連續採收三個月。

採收時，用手輕輕握著菌體，左右轉動，向上提取，絕不可連帶菌絲採收。

洋菇在適當環境下，每坪地(三·二七平方公尺)產量平均達十八公斤以上。

洋菇採收完了後，搬出全部堆肥，用作種菜的肥料。栽培床要洗刷清潔，再用百分之三的昇汞水，或福爾麻林液(Holmarin)消毒，準備下次培養應用。



菇洋小大的上床培栽在長