

家畜 妊娠 期中 的飼 養

一元培季一

一、妊娠日數

家畜經配種後，自受孕日至分娩日止叫做妊娠日數。家畜的妊娠日數，不但隨家畜的種類而不同，就是同一種類的家畜，妊娠日數也有相當的差異，例如豬的妊娠日數平均為一四四天，但常有二天左右的差異。普通，多胎和雙胎家畜的妊娠日數要比單胎的稍長。生產過的家畜的妊娠日數，要比初產家畜的長。其他，母畜的健康狀態、疾病、運動、營養、受孕季節及胎兒的大小等，都可影響家畜的妊娠日數。下表是常見家畜的妊娠日數。

常見家畜的妊娠日數

家畜種類	平均妊娠日數	差
牛	二八二天	約五天
豬	一一四	二
羊	一四九	二
山羊	一五一	三
兔	三一	一
馬	三三五	一〇

根據上表，可計算妊娠家畜的分娩日期。家畜妊娠期間，要特別注意飼養和管理。這期間飼養管理的好壞，會影響母體的健康，生產機能的健全，胎兒的正常發育，及分娩的順利等。

二、飼料的調配

妊娠家畜，要給與品質優良的乾草，青貯料和根菜等，並要配合適當的濃厚飼料。家畜在分娩期，必須維持充分的營養，如飼料中營養分不足，特別是蛋白質和礦物質，不但會阻礙胎兒的正常發育，而且容易使母畜消瘦衰弱，或引起流產。多產的家畜，如豬，常會因母畜營養不足，產仔數減少，仔體瘦弱，容易死亡。但營養太好的家畜，容易肥胖，以致分娩困難，也要注意。總之，妊娠期間的家畜營養，應維持中庸。

使胎兒發育正常，仔畜體質強健，妊娠後期，除母畜本身所需營養外，應特別供給良質的蛋白質、鈣和磷。

妊娠中期以後，應給與容易消化的飼料，如多給豇科良質乾草生芻，並補給良質濃厚飼料；礦物質也不應缺少。分娩前數週，飼料不可急變，食鹽不要過多。多量過冷的飲水會引起流產，應注意。

三、管理的要項

家畜妊娠後期，應儘量減輕或完全停止使役，在分娩二個星期前，必須停止使役，母牛在分娩一個月前，停止擠乳，並且隨時留意妊娠家畜的排糞狀態，特別是發生便秘症時，應在飼料上加以適當的調節。

妊娠家畜要有適度的運動，放牧在清潔的草地上最為理想。

妊娠家畜分娩前數週，分隔入產房，產房中充分給敷藥，環境要安靜，避免外傷，如滑溜、擠壓、打撲等，並應避免驚駭刺激。

被內噓通藏火籠



③ 被內藏火籠，好燒氣，阿婆去掛蚊帳了。
失時一婆阿，氣燒有籠火內被
鋪了光燒都離離燒（蓋鋪帳蚊）。

② 頂上生火，阿婆用手點，老人用火籠，（婦老）人大大老婆阿庄頂上，平，來提冷驚手脚，籠火藏內被（覺睡）。

① 北土隱類，若氣能（工作不），冬入寒（穴洞），手脚凍（怕）人，賣巧人，作賣甲凍手脚，冬入寒（穴洞），手脚凍（怕）人。

火皇文
壬酉圖