


注意蛔虫与驅虫药

存撰

所有的蛔蟲藥品，幾乎全部具有毒性，所以切不可未經醫生指示擅自購服，因為用量不當，不僅會影響治療效果而且也有危險的。

蛔蟲病是一般兒童常患的疾病，更是農村兒童普遍的病；根據粗略的估計，患這種病的農村兒童至少在半數以上。因此，蛔蟲對農村兒童健康的危害是值得農友們注意。



蛔蟲

農村兒童為什麼特別容易有蛔蟲呢？這是由於蛔蟲卵存在於蛔蟲病人的糞中，當這糞便作為肥料施用以後，田裡的作物，土壤，和農具上便沾滿了蛔蟲卵，再經過農具，人的脚底，風力，和昆蟲等直接或間接地傳播後，於是蛔蟲卵很快就散遍到每個角落。那末整天在這樣環境裡爬走玩樂的兒童們，自然也就很容易由手將蟲卵傳入口中了。

蛔蟲病的症狀不大顯著，比較常見的是：食慾不振，睡眠不安，腹痛，發疹，輕微的發熱和腸炎；如果蟲數過多，可能發生很厲害的腸絞痛，甚至於形成急性腸阻塞。在治療方面，除了前述的特別情況，需要針對該症施予特殊治療外，一般都是選用適

當的蛔蟲藥與瀉藥，使蛔蟲排出體外。但是，所有這些蛔蟲藥品，幾乎全部有毒性，所以切不可未經醫生指示而擅自購服成藥，用量不當不僅會影響治療效果，而且也有危險的。父母們日常必須注意孩子的健康情況，因為這病的症狀不太明顯而易被忽略，所以當發現稍有可疑的跡象時，便應送請醫生診斷（檢查大便是否含有蟲卵，是本症最可靠的診斷法），以求速治速癒。

蛔蟲病治療後，如果再受傳染，又可再發，因此，對於蛔蟲的預防，是最迫切重要的工作，茲介紹三點於下：

(一) 糞池最好加上蓋子，糞便貯置兩週以後再作肥料使用（利用大便醱酵所生之熱及化學物質殺滅糞中的蟲卵）。這是最有實效，最重要的預防措施。

(二) 田裡的蔬菜瓜果必須洗淨，儘可能要煮熟食用。

(三) 注意環境衛生，維持小孩手部清潔。養成飯前洗手的習慣。大家如能切實做到這幾條預防辦法，蛔蟲自然便不足為害了。



你知道嗎？世界上的蝸牛有八萬多種。它們有的會游泳，有的會跳，有的是緩步而行，有的却潛伏穴居……有生活在深海的，也有長在大樹的頂端。有的身體大到兩尺長，有的却小到像一粒砂子一樣。

男兒工褲



本刊六卷廿一期介紹了一件男兒秋裝的衣服樣式，於是許多媽媽來信問這件工褲的裁法與做法，現在特別將那件工褲尺寸介紹於後。

照圖剪成紙樣平鋪布上再裁（如果你很有把握，直接畫在布上裁也可以），裁時留出縫邊，褲腳口縫邊要多留一些。

做時先將後片褲的雙層處車好，這樣要經久一些。前片小便處開口也先做好，然後縫其餘的部分，最後加吊帶即成。

這件衣服女孩也可以用的，只是不必做前片的開口罷了，你也可以在胸部加一個口袋。

