

猪的去勢

——江清海——



如稍學習，每人都能把自己的猪去勢，不必請「閹猪仔」來代做。下面介紹猪去勢的方法，農友們不妨一試。

一、去勢的適期

公仔猪的去勢適期，是出生後二十日前後，因為在這時期「保定」及手術較容易，傷口也快痊癒。

如由於發育不佳、疾病或其他的關係，在上述時期不能去勢，便應在離乳二星期以前去勢較好，因為這樣到離乳的時候，傷口就已經痊癒，仔猪的元氣也已恢復。

萬不得已到離乳時仍不能去勢，便要等到離乳一星期後，小豬吃慣飼料時去勢。


二、手術前的準備和注意

手術要用的藥品及器具如下：來曹皂液（クレゾール石鹼液）稀釋一

至二%（用其他消毒藥品代替亦可，但不可用強烈刺激性），紅藥水，外科刀（可用剃刀代替）、外科剪刀（可用普通剪刀代替）和絲線（可用苧麻線或棉線代替），普通可以使用代用器具動手手術，但養母猪較多的農家，最好買外科器具來用較為安全。

哺乳中的仔猪不必絕食，但吃乳外另吃飼料的應停給飼料二至三次。離乳後的仔猪須絕食三次後用手術。

手術前，猪舍要先清掃乾淨，褥草須換新。



圖一：助手用左手扶猪，右手用剪刀剪去左右兩側的睾丸。保定人注意，不可讓猪動。

乾淨。仔猪如下痢，因會污染手術傷口，應延期用手術。在溫暖的晴天用手術，傷口的痊癒較好。

三、手術的步驟

(1) 消毒用具 手術器具齊備後


全部放進清潔的鍋內，用清水煮沸廿分鐘。不便煮沸消毒的，可用一至二%來曹稀釋液（クレゾール石鹼液）浸潤消毒。手術者的手須剪短指甲，用來曹皂液充分消毒。然後用來曹皂一至二%液洗淨陰囊及其附近，再塗擦紅藥水。

(2) 「保定」的要領 「保定」就是助手捉住仔猪，使手術的人容易動手手術。

最妥善的保定方法是在地上掘挖小溝，溝上敷草袋或布袋，把仔猪背部放在溝上仰臥，保定者的兩腿緊夾仔猪的頭部，用左手緊握猪的左前後脚，右手握右前後脚（看圖一）。但這時不可把猪的左右脚向外伸張，不然因睾丸太緊張，手術者不易把持舉丸動手手術。

要保定較大仔猪時，助手可用布袋等蓋在猪的前後腿，然後坐在上面，左右兩手握猪左右兩脚，這樣較為妥善。

(3) 剷除左右舉丸 手術者用左



圖二：手術者用左手緊握舉丸，右手用剪刀剪去左右兩側的舉丸。注意，不可讓猪動。

恭賀新禧

臺灣區植物油製煉工業同業公會

理事長	吳敦禮
常務理事	張伯英
常務理事	謝春木
常務理事	林山鐘
常務理事	汪永和

恭賀親愛的農友們！

欲買可靠安全的種子

請用合成的種子保證優良收量豐富

- ◎長岡交配一號甘藍
- ◎長岡交配二號白菜
- ◎ミスターランド菠菜
- ◎大梅花大根生食用生結球高苣
- ◎潮洋目瓜
- ◎フリチャード蕃茄
- ◎美國紅心五寸人參
- ◎飲藥山東白菜子
- ◎丸葉山東白菜子
- ◎西洋松茸（マツタケ）菌

其他品種甚多不克備載請向敝行照會訂購無任歡迎

新合成種子行

臺北市迪化街一段二一五號

電話：四三三二二三號

郵政劃撥金：一二四三五號