



(稱名位部各體豬)

你會選購仔豬嗎？

江清海

一、好的仔豬

選擇仔豬，要考慮下面幾項：

(1) 血統 仔豬的好壞和血統很有關係。

奶時仔豬的發育很好而整齊，每胎仔豬離奶至一八

○天的生長甚快且很健康，這豬的血統便是好的。

(2) 外貌和體型 豬如沒有血統記載，只好由外貌和體型來判斷好壞。如有血統記錄，外貌和體型也可以做選擇的參考。要選擇好肉豬(本地種母豬和盤克夏種公豬交配所生的第一代雜種豬)的條件如下：

①頭部及頸部：頭部的大小要適當，細緻而不粗野。鼻端要寬大，兩耳和兩眼的間隔都要寬宏。眼睛要大而明亮。頸部的長度和厚度要適當而與頭部及肩部的連繫良好。

②前軀：肩部要緊而傾斜適當，與中軀的連繫良好，胸圍寬而深且飽滿。

③中軀：中軀長，背和腰部要強健且寬長，肋骨的彎度要大，側腹部深而長。腹部不可過度下垂。如母豬，乳頭要凸出，乳頭有五至六對，排列整齊。

④後軀：臀部要寬且長而飽滿，腰至尾部傾斜輕微。腿深而寬厚堅實。四肢直而強健有力，長短適當，蹄質良好。

此外，還要注意仔豬被毛光亮，皮膚薄而無皺紋，體深而寬，沒有歇兒尼亞(ヘルニア)、陰學

(學丸潛腹腔內)等遺傳性的缺點才好。

(3) 大小和年齡 仔豬的大小體重，應該與年齡配合。在本省斷奶時的仔豬體重應該有十二公斤(二十臺斤)以上才能算是好的。在哺乳期間發育好的仔豬，斷奶後發育也快。

(4) 性情 仔豬應該選擇安靜溫順的，但必須健康。

(5) 食欲 豬的食欲和發育很有關係，食欲好的仔豬，發育一定快，好的仔豬，一定食欲旺盛。

二、運輸上的注意點

在外面買了小豬要運回來的時候，必須注意下面幾個要點：

(1) 運輸前不要吃的過飽 一般人要賣小豬時，在秤量前都讓小豬吃一頓飽，這樣吃的過飽，常常在運輸中引起胃破裂、嘔吐或胃腸炎等。所以在運輸前不要讓小豬吃的十分飽，如吃得過飽，應讓牠稍消化後才運回來。

(2) 運輸用具須乾淨 為預防傳染病發生，運輸用的豬籠、布袋等物須注意乾淨，運過豬的器具，須經消毒後才可再用。

(3) 預防日射病 運輸中，如太陽強烈時，豬籠上須用樹葉或稻草等物遮蓋，以防止發生日射病，如夏天太熱時，要澆水於豬體。

(4) 避免強烈的搖動 運輸中，要避免強烈的搖動，以免小豬疲勞。

三、先隔離飼養

由外面剛買進來的豬隻，不可立即放進已養有

豬隻的豬舍內，或隔壁豬舍。因豬在外表上看來很健康，但有時傳染病原已潛伏於豬體內，經過數日後即發生疾病，因此自己原來養的豬也受到傳染，招來鉅大的損失。

所以剛買回來的小豬，要先養在離開豬舍的地方。如在離開豬舍的地點有隔離豬舍是最理想的，如沒有隔離豬舍，可利用空房子或在適當的地點用竹子建築一個簡單的臨時豬圈，把剛買進來的豬隻放進飼養約二星期，每天觀察牠的食欲，糞便性狀，和精神狀態。如有可疑，便要請獸醫來診治。



(寬要部臀)

慢慢變更，至二星期後才完全變更。

四、注意驅蟲及預防注射

在本省大部份豬隻都有蛔蟲寄生，這種寄生蟲，對豬隻發育有很大的障礙，所以購進豬隻時，一定要驅蟲才好。現在最好的驅蟲藥是氟化鈉。仔豬每體重一公斤，用〇.〇八公分氟化鈉，混合於乾飼料連續吃至三四天，效力律每，但應注意這藥不可混合於有水的飼料中，以免豬隻中毒。本省有二種氟化鈉驅蟲藥「畜蟲散」與「肥豬除蟲藥」，在各地藥舖有售，或可向地方農會或鄉公所購買，詳細用法在該藥品內有說明書。

為預防傳染病發生，買來的小豬要請獸醫預防注射豬瘟、豬丹毒、豬肺炎疫疫苗，以保安全。