


胡蘿蔔的灌溉

王進 生

本刊六卷十九期介紹過「食用日廣的胡蘿蔔」，高雄李承雄先生來信詢問胡蘿蔔的灌溉問題，本社特請該文作者王進先生再撰此文發表，供大家參考。

胡蘿蔔的灌溉，依實際情形，可採用下述三種方法：

- ①平畦表面灌溉：乾燥地區，無法引入灌溉水時，可用灌水桶作表面灌溉（如圖一）。時間在日落前，或早晨較宜。灌溉程度看天氣及生育程度而定。
- ②畦溝灌溉：可自由引入灌溉水的地區，在日落後引入灌溉水，至畦溝的水剛達到畦面時斷水。（如圖二）
- ③播種條間灌溉：無法引入灌溉水的地區



由上至下：

圖一：平畦表面灌溉：在日落前或早晨，用灌水桶作表面灌溉。

圖二：畦溝灌溉：日落後引入灌溉水，至水剛達到畦面時斷水。

圖三：播種條間灌溉，在畦的中央，用鋤頭開一條淺溝，挑水灌注於條溝內，至條溝水滿為止。

，不論乾濕都可用這方法。在畦的中央（播種條中間），用鋤頭開一條淺溝（但畦兩端不開，使灌溉水易於蓄留），挑水灌注於條溝內，至條溝水滿為止（如圖三）。這個方法，在氣溫高時，比表面灌溉好。

斯巴貢（スパーゴン）可向農林廳病蟲害室接洽購買。因用量不多，最好由當地農會統購。斯巴貢對於黑斑病特別有效果。黑斑病在剛發芽後侵害子苗幼根，引起相當厲害的立枯病害，因此種子消毒為唯一良好的防治方法。

李樹栽培要點

—— 蔡致謨 ——

李子的種子在洗淨後，需要經過層積（或稱砂藏），就是把砂和種子相間分層堆積，供給適宜的水分和溫度，使種皮變軟或裂開，然後檢出播在苗床中。經過這種處理的種子，發芽迅速而整齊，凡是種皮厚硬的種子，都可以應用這個方法促進發芽。

李樹在十二至二月間定植，株行距都是四至五公尺。

一年施肥兩次，十二月中旬施堆肥全部，豆餅三分之一，過磷酸鈣、硫酸鉀及牛尿二分之一，其餘在六月下旬及七月上旬間施下。

李樹多採杯狀整枝法。苗木定植後培養一年，在幹高約一公尺時剪定，等春季發芽抽梢後，選頂端強壯而平等開展於三個方向的新梢三個，任其生長，其餘新梢全部剪去。這三個主枝，用支柱扶縛，使與地面約成四十五度角度，而且使向三個方向平等開展。第二年，三個主枝留二尺到二尺五寸剪定。春季新梢伸長時，各主枝上留近於頂端強健而左右開展的二個枝條，其他新梢如生長太強盛可摘心。到冬季得六個主枝，再留一尺到一尺五寸修剪，同時使再各形成主枝兩個，這樣一共有十二個主枝，以後任其自由生長。

李樹在本年生枝上形成花芽，次年春季開花結果，短果枝最會結果，應該保留，不可剪去。每株李樹的施肥量如下：

（單位：公分）

肥料種類	十年生		十五年生	
	用量	氮素	磷質	磷質
豆餅	八六六	五五	一〇九	一七三
過磷酸鈣	六九九	二八	一〇九	一七三
硫酸鉀	一三	一〇七	五八	二四
堆肥	九三〇	五五	五七	二六
牛尿	三三三	二〇四	四九	二〇
計	一五六一	一〇三	一七三	二〇