


二、怎樣決定株行距

公尺。這距離也很適合於茶樹的自然發育和生長。

(1) 定

本省茶農普遍用孔植（或稱株植），株距多自七十公分至九十公分；行距多為一·二公尺至一·五


但是定植距離隨地勢、海拔高度、土質，以及品種等而變化，尤其山地茶區，應特別注意定植距離來減少表土的流失與冲刷。



最易成活

春植鳳梨

黃榮瑞



三園內斜傾階段單行密植圖示

坡度的關係：在平地茶區定植，以行距一·〇至一·二公尺；株距五十至八十公分較為適宜。山地因傾斜度增大

，畦寬縮小，

所以定植距離要不同。坡度在十度的，水平階段三行植，階段寬三·四公尺，行距一·一公尺，株距七至九公分（圖一）。坡度在二十度的，內傾斜階段雙行三角形密植，階段寬一·八至二·〇公尺，行距七十公分，株距五十公分（圖二）。坡度在三十度的，內傾斜階段單行密植，階段寬一·一至一·三公尺，株距五十至三十公分（圖三）。

(2) 定植距離與土質的關係：土質肥沃的，定植距離宜較土質衰弱的增大十至二十公分。

(3) 定植距離與品種的關係：大葉種的定植距離宜較小葉種增加二十公分。直立性品種的距離宜較橫張性的縮小十至二十公分。

(4) 定植距離與氣候的關係：寒冷地區的距

離宜較暖和地區縮小二十至三十公分。

(5) 定植距離與製茶種類的關係：紅茶或綠茶區的定植距離，宜較半发酵茶（包括茶及烏龍茶等）區縮小二十公分左右。

一、種苗要整齊 種苗的大小和種植後的生育有密切的關係。也可以說鳳梨栽培的成敗，由於種苗而定。所以應儘量選擇齊一的種苗。好種苗的標準，請參閱本刊第六卷十二期「怎樣採得優良的鳳梨種苗」。採下的種苗，基部向上排放於通風良好或日光直射不強的地方，如果沒有雨水濕氣的損害，可保存半年以上還不會枯死。所以春季種植用的鳳梨種苗，除冬苗外，還可利用秋季採下種苗，保存到春季種植。有人在夏果採收後，把種苗放任著生於母株上，等待春季才採下種植，這種方法會影響吸芽的生長，所以最好採下保存。

二、剝去基葉提早根植 裁植前剝去基葉的種苗，裁植後根條的發生可提早約一星期，而且容易伸入土壤中生長。沒有剝去基葉的種苗，裁植後，因葉片的阻礙，種苗不容易吸收水份，生長較遲。所以，裔芽最好剝去基葉三十至四十枚，冠芽剝去四十至五十枚，吸芽十五至二十枚。

鳳梨栽培上最怕的是植株的萎凋，所以種苗在裁植前必需消毒。剝去葉片後的種苗，經二至三天後，用富粒多三千倍液浸漬消毒五分鐘，可殺死潛伏在葉鞘中的害蟲。消毒後五至七天裁植較為安全。

三、多施堆肥、綠肥 凤梨很喜歡生育在有機質土地，所以，鳳梨園應多施用堆肥作基肥。堆肥應於裁植前按裁植行列開溝施放，然後蓋土裁植；每甲施用量約三萬五千臺斤以上。堆肥供應不到的地方，應先種植綠肥（虎爪豆）作基肥使用。此外，還要使用混合肥料（氮素四，磷酸一，鉀質四的比例）。按裁植行列開溝施放後裁植，可使鳳梨生長好。

四、每公頃栽四萬株 春植鳳梨也須密植，每公頃可栽三萬五千株至四萬株。種植時，為避免種苗掉入土壤後倒伏或葉腋間摻入土壤，應該用手握種苗葉片（如右上角的圖），挿入土中，然後用腳踏實種苗旁邊挖鬆的土壤，才把手放開，這樣種苗就不會倒伏或跳入土壤，生長較快。種植後的種種管理，和秋植鳳梨一樣。春植鳳梨的收穫期是六月下旬至九月中旬，果實等級雖比秋植的小，但大多數為二等品，很適合製罐用。