



總飼料量的百分之五十。如利用甘薯或其他根莖類飼料時，應切碎煮熟給與，較為有利。家庭的殘羹也可利用，但含鹽分或油份在百分之四以上，就對鴨隻有害，應該小心。下面介紹產卵混合飼料配合例四種，以供參考。

(1) 臺灣省農業試驗所配合例(重量百分比)

玉蜀黍四八，麸皮一〇，米糠九，大豆餅二一，魚粉五，骨粉三，貝殼粉三，食鹽一。

(2) 日本農林省畜產試驗場配合例(重量百分比)

玉蜀黍三〇，米糠一〇，麸皮一〇，稻穀一五，小麥一五，魚粉一五，麥糠五。

(3) 英國常用配合例(體積比例)

玉蜀黍粉三，麸皮二，動物質飼料(如魚粉、肉碎等)一，青飼料四。

(4) 美國常用配合例(體積比例)

玉蜀黍四，麸皮三，小麥一，燕麥一，加上等量之青飼料。

飼料給與乾餌或濕餌都可以。應用濕餌時，要特別注意飼料槽的清潔衛生。每次飼料給與量要適當，避免在槽內剩留飼料腐敗發酸。

鴨放飼時，在早晨放鴨時餵一次，每隻約給與一握谷類飼料，並給與清潔飲水。傍晚當鴨羣回舍時，再給與混合飼料一次。冷天鴨羣在野外找食困難時，早晚飼料中，應加些煮熟的菜葉攪拌給與。飼料量應視鴨隻在外覓食回舍時腹部的飽滿程度而定。

鴨隻如果沒有場地可放牧時，可在庭院或園地的一角用木柵或竹籬圍飼。這種飼養法多

利用家庭的殘羹及農場的副產品。圍飼的鴨隻比較容易肥胖，過於肥胖的鴨隻對於產卵很有影響，應加注意。圍飼的鴨隻應有飲水器。飲水器深度要在四吋以上，便於鴨隻飲用及供鴨隻洗滌鼻腔。其他，又應經常放些砂粒、貝殼使鴨自由採食。圍飼鴨隻每日的飼料量，平均約為一三〇公分，產卵多時飼料的需要就較多。

### 三、鴨群不可受驚



鴨舍要注意通風良好，保持清潔、乾燥，使鴨羣舒適。墊草應常更換；每晨當鴨羣放出後要清掃一次，並把墊草在日光下曬乾再用，一週後更換全部墊草一次。

鴨應有充分面積及適當的運動場；飼養少數的每隻平均需要五至六平方呎，飼養七、八十隻，每隻平均需四平方呎。如果養二〇〇隻左右，每隻平均只需三平方呎。

鴨隻換羽季節，多在七、八月開始。普通換羽期為二個半月左右。產卵成績優良的，一面換羽，一面仍繼續產卵。換羽初期的飼料，可減少動物性蛋白質而增加麸皮飼料。新羽長出前後，就須增加動物質飼料。

卵用鴨舍，最好靠近水流。放飼鴨隻，應在十時半以後；因鴨隻產卵多在清晨至十時半以前，這時候放鴨，鴨會在外面產蛋而損失。

產卵鴨是非常神經質的。管理人應和氣小心，不要使鴨羣驚慌。若鴨羣受驚，產卵就減少。一切環境絕不可忽然改變。鴨是食食的家禽，吃食時浪費飼料很多，管理人應注意。



輸錢的趁所 繳拔愛為因旺火⑥  
此從 笑見真丙阿着看 了了  
繳拔嗶悔反

歡真食有看有 去返就影電了看⑥  
繳拔年新 錢省真樂娛影電喜  
(博賭必何) 昨卜是

招春新 子(變)痛真影阿丙阿④  
有(又)甲色有影電 影電看子  
(吃邊看邊)餅食那聽那看那 聲