花卉

怎樣栽培水仙花？

問：請詳細指示水仙花的栽培方法。（高雄縣阿蓮鄉王天發）

答：種植時期：在臺灣種植適期是九月下旬至十一月上旬。在十二月仍然可以栽植，不過開花和生長較差。

株距：看球根的大小而定，大球需距離十六公分以上。深度約十三公分，深植的生長比較淺植的要好。

土壤肥料：水仙對於土質選擇不嚴，任何土壤都可以栽培，最好是肥瘠平均，物理性良好的土壤。基肥應多用。水仙種植後，可以二、三年不換栽，所以土壤要保持肥沃。普通基肥都用堆肥腐葉等，在種植前，和土壤充分混合。追肥約在十二月中，用稀薄人糞尿，施一、二次。

管理：生長期，必須經常保持土壤濕潤。如果以產球為目的，在葉子沒有變黃的時候，不能去葉，否則可能會使球不充實。早去花可以使球充實，因此在二月間開花後，就可以把花剪除。

採收：在葉片變黃後，就設法掘起陰乾，把葉片在通風的地位，留待秋冬種植。掘起貯藏比較就地貯藏能早開花。（士林園藝試驗分所鄭達文）

晚生花椰菜可以留種麼？

問：日本晚生巨大花椰菜在新竹縣境可以採種嗎？（新竹縣芎林鄉林保璋）

答：花椰菜自開花到種子成熟大概自十一月至次年四月，其間必須乾燥無雨，否則植株容易發病腐死，不易採到種子，所以花椰菜在本省濁水溪以南地區才有經濟的採種價值。

日本晚生巨大花椰菜在新竹區的開花期約自一月上旬起至二月中旬。種子的成熟期約自三月中旬至五月底，但在三月後因為常常有下雨，種子生產很不安定，縱使能採到種子也沒有經濟價值。尤其在晚播晚開花的時候，遇到高溫多雨，留種就更困難。（鳳山熱帶園藝試驗分所郁宗雄）

蔬菜

蔬菜病害可以用穀仁樂生預防

問：①用穀仁樂生來防治蔬菜病害是否可以？（嘉義市羅金生）

②穀仁樂生的五百倍液可以防治洋葱黑斑病。請問何處有穀仁樂生可買？（嘉義縣東石鄉張金水）

答：①穀仁樂生可以用來消毒蔬菜種子，如瓜類、番茄、辣椒、茄子、白菜、芥藍、蘿蔔等。應用的方法是先調配成一千五百倍的溶液，浸種五分鐘，然後用清水冲洗。等種子乾燥以後，再用「賜保根」拌種。拌種的藥量是每公斤種子用「賜保根」六公分。準備浸種消毒的種子必須新鮮而顆粒飽滿的才可適用。否則會影響種子發芽率。（省農業試驗所洪章訓）

②洋葱病害防治所需要的穀仁樂生，如果是零星購用的話，可向嘉義縣政府農林課或農會請購，每磅二十二元；如果需要大量（至少一百磅）可由貴地公所向臺中市臺灣省政府農林廳申購。（省農林廳農產課王鼎定）

讀者服務

△廉價出售柚木苗木，歡迎農友們採購。臺南縣南化鄉南化村八四號王茂丁。

△廉讓純「撒館」種乳母羊四頭，二至五歲，現產乳中。高雄縣小港鄉小港村平和路十五號張克仁。

△出讓來克亨公鷄，美國亨生M及Y系統各一隻（有血統書）。臺北縣南港鎮東新里十一號周承琳。

▲徵求肉用種鷄「不老母」（フラマ）及「九斤黃」（コーチン）之種蛋各十個。雲林縣西螺鎮新豐里一〇二號黃鳳雲。

▲徵購優良種一批，約種五分地之數量。請以最低價函臺北縣內湖鄉胡州村二十一號丁傳法。

按：本欄服務對象限本刊現在訂戶，發表之姓名住址應與原登記者完全相同，故請來信時附入郵寄豐年之封套，以此為據。

豐年牌農藥價格表

種類	成份	包裝	單位	零售價格
把拉松乳劑（パラチオン）	四〇%	一〇〇cc 二五〇cc	每瓶 每瓶	一七〇 三八〇
PM乳劑（ピーエム）	三〇%	一〇〇cc 二五〇cc	每瓶 每瓶	一六〇 三七〇
馬拉松乳劑（マラソン）	五〇%	一〇〇cc 二五〇cc	每瓶 每瓶	一三〇 三〇〇
有機水銀劑 克利覆（日名ルベロン乳劑）	水銀一五%			三五〇

本廠所出品之優點

一、成份＝保證與國際標準相同。
二、效能＝比國外加工品優良。
三、價格＝比配售價便宜。
四、防治病蟲害＝範圍廣濶，各種農林作物病蟲害均有特效、使用便利。
五、購用便利＝全省各級農會及農藥商均可隨時按上列價格購到應用。

◎徵求地方經銷處條件從優請函索即覆之

興民化學工廠總營業所（元南興）
臺中市中山路一九五號
電話一九五五號

與農的純正種子能生產品質優良的產品使你得到較多的利益！

夏光蕃茄　一袋一〇元
ペアソン　五元
光華　五元
マグローブ　五元
露地香瓜　五元
潮洋刺瓜　五元
洋角椒　五元
甘味大甜椒　五元
加州大甜椒　五元
屏東長茄子　五元
HN大果木瓜　五元
O—Sクロス甘藍　五元

◉農藥
マラソン乳劑
パラチオン
水銀ボルドー
砒酸鉛
硫酸ニコチン
ホリドール等
在庫豐富！

興農園藝新知識四月一日發行豫定
（付郵票二元函索即寄）



興農種子行
臺北縣三重鎮一段46號
郵政劃撥儲金4028