


蔬菜



南部西瓜爲什麼

比中部的大？

問：雲林縣一個西瓜不過重六公斤，高雄方面一個西瓜比雲

林方面的大二、三倍，這是氣候

關係，還是栽培法關係？（雲林

答：西瓜的大小品種有關，但同一品

種又和各地的氣候有關。南部的「大和黃」

西瓜是大型果品種；中北部栽的「新大和」

系西瓜是中型果品種。如以同樣一種「大和

黃」而論，在南部因有長時間的溫暖乾燥氣候

，生長適宜，所以能結大果；中北部溫暖時

雨水較多，生長較差，容易發病，所以果實

較小。再以同一品種同一地方面論，如南部

春作生長初期在低溫，結果期在高溫，所以

結果較大；秋播生長初期在高溫，結果期在

低溫，所以果實較小；夏作因爲高溫多雨，

果實最小。此外在栽培方法方面，諸如是否會

把種子消毒，施肥、灌水、病蟲害防治等管

理操作的是否謹慎，和結出的西瓜大小都有

關係。（鳳山熱帶園藝試驗分所郁宗雄）

種番茄注意防治「疫病」

問：我種的番茄從前年起，每年一、二月都發生這種病害。番茄的葉片發生暗綠色黑墨狀的點點東西，傳染是由下而上，約經過十天就全株枯萎了。附上病樣。請問這是什麼病？怎樣防治？（高雄縣大肚鄉呂石松）

答：檢查你寄來番茄病害標本的結果，這是「疫病」。在氣溫寒冷的時候，這種病害很是普遍。而且在陰天多雨時這種病害蔓

子、菸草等都能相互傳染。

防治可撒佈「大生」液劑，在幼苗時期就要撒藥二、三次。藥劑用量是每十公升清水加「大生」二十公分。在移植之後也要繼續撒藥。本田裡的番茄第一次撒藥時間，應在移植後三十天左右，約在第一次開花之後開始。本生時撒藥的用量是每十公升清水加「大生」二十五公分。隨後每隔十天撒藥一次。如果遇到經常下雨時，撒藥間隔有效應縮短爲七天撒藥一次。要使藥劑達到有效防病目的，應該注意所撒佈的藥液是否均勻噴藥時，噴霧器要有強大的壓力，噴出來的小滴愈細愈好。此外，這種病菌生在葉的背面，所以撒藥時也應當注意。（省農業試驗所洪章訓）（按：番茄疫病用波爾多液噴撒防治也可以見效）

茶

茶樹注意避免葉片變黃

問：茶樹葉片變黃是什麼原因？肥料是全部用人糞尿，且不完全腐熟。（桃園縣龍潭鄉羅濱

茶園試驗分所郁宗雄）

茶樹的葉片發黃是什麼原因？

因肥料是全部用人糞尿，且不完全腐熟。（桃園縣龍潭鄉羅濱

茶園試驗分所郁宗雄）

茶樹葉片變黃是什麼原因？肥料是全部用人糞尿，且不完全腐熟。（桃園縣龍潭鄉羅濱

茶園試驗分所郁宗雄）

茶

茶樹注意避免葉片變黃

問：茶樹葉片變黃是什麼原因？肥料是全部用人糞尿，且不完全腐熟。（桃園縣龍潭鄉羅濱

茶園試驗分所郁宗雄）

茶樹葉片變黃是什麼原因？肥料是全部用人糞尿，且不完全腐熟。（桃園縣龍潭鄉羅濱

茶園試驗分所郁宗雄）

森林

山黃麻怎樣造林？

問：①山黃麻造林適合在本省什麼地區？

②山黃麻造林是播種還是扦插育苗？種子或苗木何處有售？

③成材有那些用途？

④造林成功需要多少年？經濟價值怎樣

？（高雄縣大寮鄉吳溫琪）

答：①山黃麻的造林適合地區：全島低

海拔叢林，次生林，荒地，村落周圍，開墾地和伐採過的林地。

②造林用苗木：可在山野採取野生苗，或播種育苗。因種子或苗木都無處可買到。

③木材用途：木材除適於製木板外，還可以供建築（杆，樁），車輛（車止即制動裝置），家具（櫈板），風箱，農具（犁轍，水車踏板），傘軀，水槽，粗影，下等棺木等用途。也可作次級火柴桿和壓紙原料，但

以供製造火藥原料最爲適合。南洋各地有拿

樹皮提取單寧；把樹葉作爲人或山羊食料；

根作爲藥用，治舌痛、腹瀉和血尿等疾病。

④生長：生長很快，十餘年生就成大材

。在臺中地區的十七年生大樹，樹高二三

七三公尺，胸高直徑三〇・九公分。

經濟價值：不高。（省林業試驗所甘偉

好速牌馬拉松乳劑
ORTHO-MALATHION
(マラソン)



現貨供應 (1) 廣裕興貿易行 臺中市中區成功路 33 號
(2) 林英杰先生 臺中市西區三民路 114 號 (婦女會左隣)
(3) 員林(交)運輸公司內



好速福 (パラソン)
ORTHO-METHYL-PARATHION
(與富粒多品質相同)

大豐年農化工廠 臺中縣霧峰中正路 53 號

延很快。發病原因是由於病菌爲害。

這種病害能够很快

的傳染到馬鈴薯上

，並在土壤附近所栽培

的馬鈴薯發生了這

種嚴重損害；如果

病也會傳染到番茄

上。他如番椒、茄

子、菸草等也都可能相互傳染。

防治可撒佈「大生」液劑，在幼苗時期

就要撒藥二、三次。藥劑用量是每十公升清

水加「大生」二十公分。在移植之後也要繼

續撒藥。本田裡的番茄第一次撒藥時間，應

在移植後三十天左右，約在第一次開花之後

開始。本生時撒藥的用量是每十公升清水加

「大生」二十五公分。隨後每隔十天撒藥一

次。如果遇到經常下雨時，撒藥間隔有效

應縮短爲七天撒藥一次。要使藥劑達到有效

防病目的，應該注意所撒佈的藥液是否均勻

噴藥時，噴霧器要有強大的壓力，噴出來

的小滴愈細愈好。此外，這種病菌生在葉的

背面，所以撒藥時也應當注意。（省農業試

驗所洪章訓）（按：番茄疫病用波爾多液噴

撒防治也可以見效）

要素肥料的配合。你用人糞尿，務必要在腐熟後施用，或作堆肥後施用更好，並加施些磷肥和鉀肥。

茶園最好不要間作，如果要間作應選

種矮小的豆科植物，不要影響通風良好。

把因病被害枯死，或被害嚴重的茶樹

全部連根拔除就地用火焚燒，注意勿將土壤

堆放到健全茶樹近旁，並用二硫化鐵將土壤

消毒（依每一坪地用二硫化鐵一磅計）。

